

ہومیو پیتھی سے شفا یاب کیسز

مصنف

ڈاکٹر پی چتر جی

ترجمہ و تلخیص

ڈاکٹر عابد علی

ایم ایس سی، ڈی ایچ ایم ایس

ایم ڈی، پی جی ڈی کمپیوٹر

پی ایچ ڈی فیلو

H/DR. S. M. ZAFFAR
B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.
Ex-Lecturer G.H.M. College

پاکستان ہومیو پیتھی سوسائٹی

ہومیو سٹور اینڈ ڈسٹریبیوٹرز فون: 587555

کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت اس کتاب کے جملہ حقوق
بحق ناشر محفوظ ہیں۔

اشاعت اول ۲۰۰۳ء
تعداد ایک ہزار
کمپوزنگ درانی کمپیوٹرز اینڈ کمپوزر حیدری
قیمت 70 روپے

اسٹاکسٹ

ہائمن بک ہاؤس اینڈ فارمیسی
کنیز اسکوائر، ناظم آباد، نمبر ۷، کراچی۔
فون۔ ۶۶۱۴۰۳۰

رحیم ہومیو پیتھک اسٹور
لاہور آرٹ پریس بلڈنگ
نیوانارکلی لاہور۔

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
11	فالج (پیرالائیک اسٹروک)	1
18	گھٹنے کا درد	2
28	منہ کا پرانا السر	3
35	دوا کی لت	4
38	رحم میں رسولی	5
45	بائیں چھاتی میں رسولی	6
52	پرانا دمہ	7
57	تالو پر زخم، معدے کی تکالیف	8
62	پیشاب کا انفیکشن	9
68	گھٹنے کا درد اور کم بلڈ پریشر	10
75	پرانا مو روٹی دمہ	11
81	تکلیف حیف کی کثرت	12
87	پرانا نزلہ	13

93	پرائی جلدی خارش	14
101	پرائی درد سر اور نیند کی کمی	15
104	محبت میں ناکامی	16
108	خواتین سے جھجک	17
112	پرائی نزلہ اور کان کا انفیکشن	18
117	گلے کی پرائی تکلیف	19
119	خاندانی منصوبہ بندی کے اثرات	20
122	سر کا مستقل درد	21
126	چہرے کی پرائی خارش	22
132	چھاتیوں میں گلٹی	23
135	بیضہ دانی کی رسوبی	24
142	معدے میں خون کا رساؤ	25
149	اعصابی نظام کی خرابی اور نزلہ وز کام	26



FOREWARD

مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ڈاکٹر چڑجی کی کتاب "مائی میو-ہیل کیورز" پر چند سطر میں لکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے ان کے لیکچرز میں شرکت کی ہے۔ لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کے یادگار شفا یاب کیسز کی قیمتی معلومات اس کتابچے کی شکل میں ہومیو پیتھک برادری کو دستیاب ہو جائیگی۔

ڈاکٹر ٹی پی چڑجی اپنی زندگی کے اسی ویس سال میں ہیں۔ کلکتہ یونیورسٹی سے اکنامکس میں ایم۔ اے حساب میں ماسٹرز اور میڈیسیٹ ہیں۔ آپ نے ایل ایل بی کی ٹریننگ بھی مکمل کی تھی۔ لیکن فائنل امتحان میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ مرکزی حکومت میں ملازم تھے اور نئی دہلی میں سیکریٹریٹ کے بہت سینئر آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔

1930 میں ان کے دور شتے کے بھائی پیپس کی وجہ سے بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے اس وقت آپ نے ہومیو پیتھی کے جادوئی اثر کا کمال دیکھا جس سے دونوں بھائی بالکل ٹھیک ہو گئے اس سے پہلے وہ ہر طرح کا علاج کروا چکے تھے۔ اس واقعے نے ان پر گہرا اثر چھوڑا جس کے بعد وہ ہومیو پیتھی کے شاگرد بن گئے۔ اور احتیاط کے ساتھ ہومیو پیتھی کی کتابیں اور جرنلز کا مطالعہ کرنے لگے اس کے علاوہ اپنی کلینکل معلومات بڑھانے کے لیے اہم ایلوپیتھک کتابوں اور جرنلز اور فارماکوپیا کا مطالعہ بھی جاری رکھا اس لیے ان کی تحریر میں اس کا عکس نظر آتا ہے وہ اپنے تجربات اور اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر رجسٹرڈ پریکٹیشنرز بن گئے۔

اس سے پہلے انھوں نے دو بہت قیمتی کتابیں تحریر کی ہیں۔

1. Fundamentals of Homeopathy
2. Valuable Hints for Practice and Highlights of Homee -Practice.

جوان کی قابلیت کی آئینہ دار ہیں۔ اور واضح کلینیکل گہرائی رکھتی ہیں۔ جس کا ہومیو پیتھک پیشے نے اعتراف کیا ہے۔ موجودہ کتاب میں 26 کیسز کو بیان کیا گیا ہے۔ جن میں مختلف انواع کلینیکل حالتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جیسے:

Paralysis, Osteo-arthritis, drug addiction, asthma, chronic Ulcer, migraine.

اسکے علاوہ گائناکولوجی حالتوں پر جیسے:

Ovarian cysts, Lumps in breast, prolapsed Uterus, after effects of M T P. etc

اور ان جیسے دوسرے مشکل کیسز جن میں Obsessive neurosis شامل ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب و پیش کش میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام کیسز میں نہ صرف کلاسیکی ہومیو پیتھی علاج اپنایا گیا ہے۔ بلکہ کیس کی تفصیلات ترتیب وار اور متعلقہ سرخیوں کے ساتھ رکھی گئی ہیں۔ جن میں مرض کی شکایت ظاہری معلومات، معائنہ، نسخہ، پس منظر، میازم، ایلو پیتھک تشخیص۔ کلینیکل اور پیتھالوجیکل تفصیلات اور مزید تجزیے کے لیے ہدایات، استعمال کردہ پوٹنسی اور وقت کے ساتھ کیس میں ہونے والی تبدیلیاں درج کی گئی ہیں۔

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر چڑجی اپنے تجربات پر مبنی بائیو کیمک ادویہ اور مددکنچرز کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ غذا پر بھی ہدایات دیتے ہیں۔ مریض کی ذہنی علامات بہت واضح بیان کرتے ہیں۔ پڑھنے والے اس کتاب کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس میں قابل بھروسہ اور واضح تفصیلات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ڈیٹا دستیاب نہیں ہوتا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل ڈاکٹر صاحبان مریض کی تمام تفصیلات جمع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنا علم دوسرے تک پہنچانا نہیں چاہتے۔ جس کے نتیجے میں ہومیو پیتھی پر موجود لٹریچر صرف اور صرف غیر میڈیکل پریکٹیشنرز کے ہاتھوں تیار ہوا ہے۔ ان میں اکثر ہومیو ڈاکٹرز کا تعلق دوسرے پروفیشن سے ہوتا ہے لیکن ہومیو پیتھی میں بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں۔

ہومیو پیتھی کے اولین سند یافتہ ڈاکٹرز نے بھی اضافی تعلیم حاصل کی تھی جیسے ڈاکٹر کینٹ ایم ڈی ہونے کے ساتھ ایم اے بھی تھے اس طرح بوہنگ گائن بھی ایک تربیت یافتہ وکیل تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ان زیر تربیت ڈاکٹروں کو اعتماد فراہم کرے گی جو ٹریننگ کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ہومیو پیتھک اصولوں کے مطابق احتیاط سے علامات ریکارڈ کریں اور نسخہ تجویز کر سکیں۔ یہ کتاب ان ڈاکٹرز کے یقین کی پختگی میں اضافہ کرے گی جو پہلے ہی ہومیو پیتھک اصولوں پر دوا تجویز کرتے ہیں۔

18-12-1987

B-1/24, Malviya Naygar

New Delhi - 110017

H. L. Chitkara

B. A. (Hons) D. H. S.

Ex-Editor,

The Homeopathic Sandesh
Ex-Chief Editors,
The Journal of the Homeopathic
Medical Association of India
Resident Editors,
The Homeopathic Heritage



PREFACE

چند سال پہلے میرے محترم دوست اور ساتھی دہلی کے مشہور ڈاکٹر ایچ ایل چٹکارا بی اے آنرز ڈی ایچ ایس نے مجھے نئے ہومیو پیتھک ڈاکٹروں سے میرے یادگار شفا یاب مریضوں کے متعلق گفتگو کے لئے مدعو کیا۔ میں نے اس گفتگو میں اپنے تجربات بیان کیے۔ اس کتاب کی تکمیل کے پیچھے ڈاکٹر ایچ ایل چٹکارا کی کاوشیں شامل ہیں۔ میں نے پچھلے کئی سالوں کے شفا یاب مریضوں میں سے انتخاب کیا اور اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔

اس کتاب کے مسودے کی تیاری بہت قلیل عرصے میں ہوئی ہے۔ میرے ساتھ

Mr. N. Srinivasan BSc (Engg)

Mr. Aloke Mukerjee (M.A)

Mr. Rohini Grewal and Mrs. Bhavani Singh.

نے بھی بہت محنت کی ہے۔ میں احترام کے ساتھ ڈاکٹر ایچ ایل چٹکارا کا شکر گزار ہوں۔ کتاب میں شامل cases کے علاج کے بارے میں مناسب تفصیلات دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات ہومیو پیتھی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔

7th October, 1987

T.P. Chatterjee

A-9/8, Vasant Vihar,

New Delhi 110057



پیرالائٹک اسٹروک

PARALYTIC STROKE

فالج:

ساتھ سالہ غیر شادی شدہ خاتون۔

فی وی دیکھتے ہوئے اچانک جسم کے دائیں حصے میں فالج کا اثر محسوس ہوا۔ اس سے پہلے سے وہ دل کی مریضہ ہیں اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ فالج کے حملے کے بعد ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ جس کے بعد انھیں ضروری ہدایات کے ساتھ ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ ہدایات میں ورزشیں اور درج ذیل ادویہ تجویز کی گئیں:

Lanoxin ⇨

Persantin ⇨

Disprin ⇨

Lasix ⇨

یہ ادویہ وہ کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہیں۔

معائنہ

« دائیں ہاتھ کی کلائی سے لے کر انگلیوں تک حرکت نہیں دے سکتیں باقی ہاتھ اور ٹانگوں کو بہ آسانی حرکت دے سکتی ہیں، لیکن دائیں ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکتیں۔

« زبان پر اثر ہوا ہے جس سے بولنے میں فرق پڑا ہے۔

« آواز صحیح ہے۔

« زبان تھوڑی سی دائیں جانب مڑی ہوئی ہے۔

« زبان کو اٹھا نہیں سکتیں۔

« زبان باہر نکال سکتی ہیں۔

« ایسے الفاظ ادا کر سکتی ہیں جن میں زبان کا استعمال نہیں ہوتا۔

« سماعت، حرکت، بھوک اور پیشاب پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔

« چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں اور جسم کی جلد ڈھیلی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عمر سے زیادہ نظر آرہی ہیں۔

ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں جاری ہیں۔

ہومیو پیتھک نسخہ:

1۔ کاسیکم 200 2 گلوبولز

دن میں تین مرتبہ پانچ دن تک ہومیو ادویہ کے استعمال سے دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے بعد

تک کوئی اور دوا نہ لی جائے۔

2- کریٹیکس 2x

گرم پانی میں 3 قطرے دن میں تین بار

3- ورزشیں بھی تجویز کی گئیں

زبان کے دائیں طرف ٹیڑھے پن میں کافی بہتری آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ دماغ کے بائیں حصے پر ہونے والے اثرات میں کمی آئی ہے۔

« اب کچھ الفاظ ادا کر سکتی ہیں اگرچہ بہت واضح نہیں ہیں اس لئے زبان کی ورزش

ضروری ہے۔ اپنی اس تکلیف میں بہتری سے وہ بہت خوش ہیں۔ اس کا

اظہار انھوں نے گانا گایا کر کیا۔

نسخہ:

« کا سٹیکم IM ایک بار

« سلیپیاسات دن تک۔

تجویز برائے ورزش:

« ایسے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کریں جن سے زبان کو حرکت دینا پڑے۔

« پکڑنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے کسی سخت چیز کو پکڑیں۔

« اپنی انگلیوں کو بغیر کسی مدد کے حرکت دینے کی کوشش کریں۔

6 دن بعد:

« بہتری جاری ہے۔ اب مزید الفاظ ادا کر سکتی ہیں۔

نسخہ:

- « میگنیشیا فاس 6x دن گیارہ بجے
 « کالی فاس 6x رات 9 بجے
 4 گولیاں نیم گرم پانی میں حل کر کے سات روز تک استعمال کریں۔

9 دن بعد:

- « بہتری برقرار رہی۔ اب زبان بالکل سیدھی ہے بولنے میں بہتری ہے۔ گزشتہ نسخہ مزید
 ایک ماہ تک جاری رکھنے کی ہدایات۔

ایک ماہ بعد:

- « بہتری ہوئی ہے، لیکن کچھ کمی کے ساتھ۔
 « کچھ تکلیف کے ساتھ مزید الفاظ ادا کر سکتی ہیں۔

نئی علامات یہ ہیں:

- « کبھی کبھی سینے میں تپکن یا گرمی کا احساس
 « سر میں دائیں جانب درد
 « درد بازو سے شروع ہو کر پیچھے کی جانب جاتا ہے۔ ساتھ میں دائیں کلائی، ہتھیلی
 اور انگلیوں پر اثر کرتا ہے۔
 « کلائی پر سوجن بھی ہے۔
 « بائیں ٹانگ کی دائیں جانب گھٹنے سے نیچے فٹے تک درد ہوتا ہے۔ حرکت کرنے سے

بڑھتا ہے۔ ٹھنڈک سے عصبی درد Arthralgia ہوتا ہے۔

نسخہ:

پلمہم 30 تین خوراکیں

+

sl g bd

+

Mag Phos 6x چار گولیاں سات روز تک

+

پلمہم 200 + Sl7 چار روز تک

ہاتھ پاؤں کو گرم کپڑے سے ڈھکے رکھیں۔

ایک ماہ بعد:

« کلائی کی سوجن ختم ہوگئی۔

« انگلیوں کو آہستہ سے حرکت دے سکتی ہیں۔

« لیٹ کر دائیں ہاتھ کو اوپر اٹھا سکتی ہیں۔

« بولنے میں بہتری آئی ہے۔ مزید نئے الفاظ ادا کر سکتی ہیں۔

نسخہ:

فائیو فاس 6x

چار گولیاں 1/2 کپ گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ پندرہ دن تک جاری رکھیں۔

ایک ماہ بعد:

« تھوڑی تکلیف کے ساتھ دائیں کلائی کو حرکت دے سکیں۔ سختی ابھی موجود ہے۔ اور بائیں ٹانگ میں درد بھی موجود ہے۔

نسخہ:

« رس ٹاکس 200 تین خوراکیں ساتھ میں Sl4 ایک پاؤڈر روزانہ صبح سات بجے سات روز تک فائیو فاس 6x چار گولیاں روزانہ صبح گیارہ بجے اور شام سات بجے۔

20 دن بعد:

« دائیں کلائی کی سختی میں کمی آئی ہے۔

« بائیں ٹانگ کا درد ختم ہو گیا ہے۔

« وزن میں اضافہ ہوا ہے۔

نسخہ:

« رس ٹاکس 1M 2 گلوبول کی تین خوراکیں ہر تین گھنٹے پر ایک دن کے لیے۔

« ساتھ میں Sl8 bd پانچ دن تک۔

« روزانہ ناشتے کے بعد Becosule کپسول ایک ماہ تک۔

ایک ماہ بعد:

« انگلیوں میں طاقت پیدا ہوئی ہے اور مزید حرکت کر سکتی ہیں۔ بولنے میں بہت بہتری آئی ہے۔ صرف چند الفاظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے۔ بار بار ادا کرنے سے مزید بہتری ہو جاتی ہے۔

خاتون دل کی پیدائشی تکلیف کے لیے ایلو پیتھک ادویہ کا استعمال کر رہی تھیں، لیکن ہومیو پیتھک ادویہ کے استعمال سے انہوں نے بہت بہتری محسوس کی۔ اب وہ بول کر پڑھ لیتی ہیں، لکھ سکتی ہیں، اگرچہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کیس میں مزید بہتری وقت کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ آخر میں انکو کاسٹیکم 10M دو گلوبولز کی تین خوراکیں ایک دن میں اور Sl8 bd مزید پانچ دن کے لیے تجویز کیا گیا۔ اسکے بعد کیس بند کر دیا گیا اور حالت سے مطلع کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی۔



گھٹنے کا درد

OSTEO-ARTHRITIS OF KNEES

گھٹنے کا گھٹیا:

- « پچاس سالہ شخص۔
- « چھ ماہ سے زائد عرصے سے گھٹنے کے گھٹیا میں مبتلا ہیں۔
- « تکلیف بائیں گھٹنے میں زیادہ ہے۔
- « گھٹنے پر سوجن ہے۔
- « لیٹے یا بیٹھے رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔
- « چلنے کے دوران، اونچی زمین کے لیے پاؤں اٹھانے سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن اگر صرف پاؤں کے انگوٹھے پر زور دے کر سیڑھیاں چڑھیں یا چلیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔
- « ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھٹنے کی ہڈیاں آپس میں رگڑ رہی ہوں اور ٹکرانے یا ٹوٹنے جیسی آواز آتی ہے۔

- « کافی عرصہ پہلے گھٹنوں کی تکلیف ہوئی تھی لیکن بغیر علاج ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب چھ ماہ سے دوبارہ وہی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اس بار دائیں گھٹنے کی تکلیف خود بخود دور ہو گئی ہے۔ لیکن بائیں گھٹنے کی تکلیف برقرار ہے۔
- « ایک دن دفتر جانے کی جلدی میں 150 گز کے فاصلے تک دوڑ کر گئے تھے۔ اس کے بعد سے بائیں گھٹنے میں رگڑ پیدا ہوئی اور شدید درد ہونے لگا۔
- « جسم کے کسی اور جوڑ میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔
- « اس سے پہلے خاندان میں کسی کو گھٹیا یا جوڑوں کا درد نہیں ہوا۔
- « 3 ماہ تک ہسپتال میں داخل رہے۔ جہاں Xyloric تجویز کی گئی۔
- « میڑھیاں جڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔

Synovitis + Hydrpexis + Crepitus + Cartilage

grinding-ive

نسخہ:

Xyloric 1 tab t.i.d for 3 Wks.

« اسکے بعد چھ ہفتوں کے لیے کھانے کے بعد

Idicin tid for 6 Wks. ⇨

Becosule 1 cap daily ⇨

« مندرجہ بالا ادویہ سے کوئی فرق نہیں ہوا اور بائیں گھٹنے میں تکلیف بڑھتی گئی۔ اب درد کی وجہ سے چند گز کا فاصلہ بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایلو پیتھک علاج مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ یہ نہ تو گھٹیا تھا اور نہ نقرس Rheumatoid arthritis بلکہ یہ

Osteo-arthritis کا کیس ہے جو خون کے تجزیے اور گھٹنے کی ایکس رے رپورٹ سے واضح ہوا۔ ایکس رے رپورٹ کے مطابق دونوں گھٹنوں کے Tibial Spines واضح ہیں۔ دونوں گھٹنوں میں پیلاہڈی کے قریب Osteophytes موجود ہیں جبکہ بائیں گھٹنے میں کچھ ذرات (کرچیاں) بھی موجود ہیں۔ دونوں گھٹنوں کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ نارمل ہے۔ بائیں گھٹنے میں ذرات کی موجودگی اس بات کا شک پیدا کر رہی ہے کہ پہلے کبھی چوٹ لگی ہے۔ لیکن مریض نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تاہم چوٹ کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مریض میں مزید علامات نہیں پائی گئیں سوائے اس کے کہ وہ مرض کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔

میازم:

Psora- Syphilitic «

Syphilitic میازم زیادہ واضح ہے۔ «

مندرجہ بالا علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل ادویہ تجویز کی گئیں۔

نسخہ:

« نکس و امیکا 200 آج رات سوتے وقت

« سلفر 200 کل صبح کے وقت۔

« Sl3 اور ار جٹم میٹ 30 3 خوراکیں۔

« Sl7 bd سات روز تک

« فزیو تھراپی بند کر دیں۔ (اگر کر رہے ہوں)

سات دن بعد:

- « بہتر محسوس کر رہے ہیں۔
- « بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے گھٹنے بستر سے چھوٹے ہی درد میں کمی محسوس ہوئی۔
- « ابھی بھی Synovitis of Knee موجود ہے۔
- « کچھ حد تک سوجن میں کمی آئی ہے۔

نسخہ:

« Slid bd سات روز تک۔

سات روز بعد:

- « آرنیکا 1M تین خوراکیں ہر تیسرے گھنٹے پر۔
- « برائیونیا 3x چھ دن تک۔
- « کھانے میں سبزیوں کا استعمال۔
- « بیگن، نمائر، پیاز، اورک، چکنائی اور دودھ سے پرہیز جبکہ وہی کا استعمال جاری رہے۔

مزید چھ روز بعد:

- « دائیں گھٹنے میں وضع بہتری آئی ہے۔
- « بائیں گھٹنے میں بہت کم بہتری ہوئی ہے۔
- « دباؤ ڈالنے پر درد میں کمی ہوئی ہے۔
- « اگلے سات روز تک برائیونیا 3x کا استعمال تجویز کیا گیا۔

مزید سات روز بعد:

- « دونوں ٹانگوں میں بہتری ہوئی ہے۔
- « دائیں گھٹنے سے سوجن ختم ہو گئی ہے۔
- « اور بائیں گھٹنے میں بہت کم سوجن رہ گئی ہے۔
- « برائینو 3x کا استعمال مزید 25 روز کے لیے تجویز کیا گیا۔

ایک ماہ بعد:

- « واضح بہتری آئی ہے۔
- « اب یہ آسانی چل سکتے ہیں لیکن ذرا تیز چلنے سے ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے۔

نسخہ:

- « سلفر 200 ایک خوراک
- « دو ہفتے کے لیے SI کا استعمال

دو ہفتے بعد:

- « اورم میٹ 1M 2 گھنٹیوں پر 3 گھنٹے پر ایک دن کے لیے
- « SI دو ہفتے کے لیے۔

دو ہفتے بعد:

- « اورم میٹ کے استعمال کے فوری بعد بائیں گھٹنے کے درد میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن

دوسرے دن کی آگئی۔ اس کے بعد بائیں گھٹنے میں کوئی درد نہیں ہوا۔
 « پھر وہ سفر پر گئے بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے بائیں گھٹنے میں دوبارہ درد ہو گیا۔
 لیکن آرام کرنے پر درد دور ہو گیا۔

نسخہ:

« برائیونیا 3x سات دن کے لیے

دس روز بعد:

« بائیں گھٹنے کی Patella ہڈی کے نیچے والی ہڈی میں درد بتایا گیا۔ بہت زیادہ چلنے
 اور حرکت کرنے سے ایسا ہوا۔

نسخہ:

« رونا 30 تین خوراکیں، ایک دن کے لیے۔

« Sl's چار دن تک استعمال کرنے کو کہا گیا۔

چار دن بعد:

« Tibia کے درد میں کمی آئی ہے۔

نسخہ:

سلفر 200 ایک خوراک، Sl- 4 دن تک برائیونیا 3x اور رشاکس 3x متبادل

چار دن تک۔

تیرہ دن بعد:

« کافی حد تک بہتری ہے۔

« Sl14 سات دن تک۔

ایک ماہ بعد:

« چلنے سے درد کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھٹنے میں ہونے لگتا ہے۔

نسخہ:

200 Lac-can ایک خوراک 3 روز تک صرف صبح کے وقت۔

« Sl11 bd سات روز تک۔

گیارہ روز بعد:

« تکالیف کو افاقہ ہے۔ دایاں گھٹنا ٹھیک ہے۔

« بائیں گھٹنے میں زیادہ دیر چلنے سے مستقل درد رہتا ہے۔

نسخہ:

« 2 Aurum Met 10M گلوبیولز ہر تین گھنٹے پر ایک دن کے لیے۔

« Sl12 bd چھ روز تک

ایک ہفتے بعد:

بالکل ٹھیک ہیں کوئی دوا تجویز نہیں کی گئی۔
ایک ماہ بعد بالکل ٹھیک ہیں اب زیادہ فاصلے تک چل سکتے ہیں۔ لیکن تیز چلنے سے
بائیں گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے۔

نسخہ:

« Aurum Met CM دو گلوبولز ہر تین گھنٹے پر ایک دن کے لیے۔

« 6 Sl₁₂ bd دن تک

3 دن بعد:

« پچھلے 3 دن سے درد بڑھ گیا ہے۔ لیکن آج صبح سے کچھ کمی آئی ہے۔
« Aurum Met CM کے اثر کو جاری رکھنے کے لیے مریض کے ذہنی اطمینان کے
لیے صرف SI ایک ماہ تک استعمال کے لیے تجویز کی گئی۔

چار ماہ بعد:

پچھلی رپورٹ کے بعد درد میں آہستہ آہستہ کمی آتی رہی، اور کچھ عرصے میں ختم ہو گیا۔ وہ
اب بہت خوش ہیں۔

دو ماہ بعد:

وہ اب بالکل صحت مند ہیں۔ مستقبل کیلئے اپنے پاس کچھ دوائیں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو

Aurum Met CM کی ایک خوراک (X) کا نشان لگا کر اور مناسب مقدار میں SI دے دیا اور کہا گیا کہ سب سے پہلے (X) پاؤڈر استعمال کریں، بعد میں دوسرا پاؤڈر دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہے۔

« ہدایت کی گئی کہ دو سے تین ماہ تک تیز چلنے سے پرہیز کریں غذا میں گوشت، چکنائی، شکر، دودھ وغیرہ کا استعمال بند کریں۔ صرف ہنریاں استعمال کریں۔

تبصرہ:

یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کیس کو نکس و امیکا اور سلفر سے شروع کیا گیا۔ نکس و امیکا ایلو پیتھک ادویہ کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ اور ہومیو پیتھک ادویہ کیلئے جگہ بناتی ہے۔ جبکہ سلفر اس کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اور ساتھ میں سلفر Synovitis کے لئے بھی مددگار ہوتی ہے۔ اور گھٹنے میں exudates کے جذب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ Arg-met کو گھٹنے کے Cartilage کی حفاظت کے لئے استعمال کیا گیا۔ Cartilage کو Osteo-arthritis میں بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آرنیکا کے استعمال سے ماضی میں ہونے والے زخم کے اثرات کو دور کیا گیا۔ ادویہ جو کیس کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہیں وہ برائیونیٹا اور Aurum met ہیں۔ برائیونیٹا آرام کی حالت میں ہونے والی تکلیف کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ گھٹنے میں Synovitis پر خاص عمل کرتی ہے۔ (Clark Dictionary vol. 1 p.319) اورم میٹ ہڈی کے ایسے عضلات کو زائل کرتی ہے جو نارمل ہڈی میں نہیں ہوتے ہیں (Clark Dictionary vol. 1 p.224) اس لئے Osteoarthritis اورم میٹ کے لئے ایک مخصوص شعبہ ہے۔ موجودہ کیس میں Aur-met نے بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ یہ مریض کی مخصوص علامات کے ساتھ میازم

(Syphlytic) کو بھی کور کرتی ہے۔ اور مریض کی ذہنی علامات پر بھی پوری اترتی ہے اس کیس میں استعمال ہونے والی تمام پانچ ادویہ مریض کی ذہنی علامات (مایوسی اور ذہنی تناؤ کو بھی دور کرتی ہیں)۔



منہ کا پرانا السر

CHRONIC MOUTH ULCER

« 43 سالہ شخص

« 17 سال سے منہ کے السر میں مبتلا ہیں۔

« زبان، مسوڑھے ہونٹ، گالوں کی اندرونی دیوار پر السر کے اثرات ہیں۔

« ابتدا میں السر ہوا جو Vit B کمپلکس کے استعمال سے دور ہو گیا۔ لیکن اب وٹامن

سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس کی وجہ سے غذا نگلتے وقت مریض کو تکلیف ہوتی

ہے۔

« نچلے ہونٹ اور نچلے مسوڑھے کی جڑ میں السر موجود ہے۔ پہلے سرخی آئی پھر اس پر سفید

تہہ بن گئی جس کے چاروں طرف سرخی ہے۔

« سردیوں میں اس میں کمی ہو جاتی ہے جبکہ گرمیوں اور بارش کے موسم میں بڑھ جاتی

ہے۔ آجکل مستقل ہے۔

« سورج برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر دھوپ میں رہنے سے سر میں درد شروع

ہو جاتا ہے۔

- « پیشاب شروع میں ٹھیک آتا ہے، لیکن آخر میں قطرے آتے ہیں۔
- « نیم ٹھوس پاخانہ، پاخانے میں Amoebic Cyst پائی گئی ہے۔
- « ناک کی جڑ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور بند ناک کو صاف کرنے پر کچھ نہیں نکلتا۔
- « رات 12 بجے کے بعد مہرز میں درد محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے اور مریض بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔
- « جوتے پہننے سے پیر گرم ہو جاتے ہیں۔
- « حساس اور جذباتی ہیں۔
- « ٹھنڈک سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے نیزل ڈراپ سے بہتر ہو جاتا ہے۔
- « 20 سال کی عمر میں سر کے بل گرنے سے سر پر چوٹ آئی تھی دو دن تک بیہوشی کی حالت میں رہے۔ 32 سال کی عمر میں ٹائیفائیڈ ہوا۔
- « والد کو یرقان ہوا اور ماں کو دمہ ہے۔
- « اپنی عمر سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ چہرے پر جھریاں ہیں۔ دبلے ہیں، رنگ صاف ہے۔ دانتوں کی شکل نارمل ہے۔ کچھ دانت جڑ کی طرف سے گلے ہوئے ہیں۔
- « بلڈ پریشر کم (110/60)، نبض 78، اور دل ٹھیک ہے۔
- « آواز واضح نہیں ہے۔ زبان صاف اور نرم ہے۔
- « گلا صاف ہے۔
- « میازم سوراسفلیک
- « یہ ایسا کیس ہے۔ جس میں سفلیک اثر واضح ہے یعنی مریض کا اپنی عمر سے بڑا لگنا، چہرے پر جھریاں، دانت کی جڑ گلنا، منہ کا سرا اور امیاس شامل ہیں۔

نسخہ:

« مرک سال 6، 30 اور 200 ایک خوراک ہر ایک کی۔

« SI 11 سات دن تک

« Lederplex، وٹامن بی کمپلکس ایک چائے کا چمچ روزانہ ناشتے اور رات کھانے کے بعد لینا ضروری ہے۔

« وٹامن سی کی ایک گولی روزانہ۔

« (Hb) ہموگلوبن، اور پیشاب کے ٹیسٹ کے لیے یدایت دی گئی۔

چھ روز بعد:

پیشاب کی رپورٹ:

Albumin. Trace, Urates: +++, Pus cells a few, Mucus threads +, Hb 14.1, TLC 8800, Neutro 60%, Lympho. 37%, Eosino 3% Gum below lower lip OK, A small Ulcer had appeared inside right cheek,

نچلے ہونٹ کے پاس مسوڑھے ٹھیک ہیں۔ دائیں گال کے اندرونی طرف چھوٹا سا زخم موجود ہے پاخانے میں تھوڑی بہتری آئی ہے۔

نسخہ:

« SI 14 سات روز تک

« ایکیشیا اور کیلنڈولا مدرچجر: مقدار میں۔ بطور mouth wash آدھا کپ ٹھنڈے پانی میں 3 قطرے ملا کر ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے استعمال کریں۔

« Lederplex اور ٹامن سی کی گولی کا استعمال جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

منہ کے زخم (السر) میں 90% بہتری ہو گئی ہے اور پاخانے میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔

نسخہ:

« SI 14 سات روز تک

« mouth wash جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

غذا میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پاخانہ کرنے سے پہلے اور بعد میں درد ہونے لگا ہے۔ اور اوپر والے مسوڑھے کی بائیں جانب درد محسوس ہو رہا ہے۔ اُن کو ہدایت کی گئی کہ منہ کے السر اور amoebiasis کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اس لیے ان کو اپنی غذا کے سلسلے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔

نسخہ:

مرک سال 200 + SI 13 bd سات روز تک صبح ناشتے کے بعد اور رات

سونے سے پہلے۔ گلیسرین اور ایکین (Echin) کو مسوڑھے اور گال کے اندرونی
دھے پر مساج کریں۔

ایک ہفتے بعد:

گال، کالسر اور پاخانہ میں بہتری آئی ہے۔

ایک ہفتے بعد:

پاخانہ کرتے وقت مبرز پر جلن محسوس ہوتی ہے جو 15 منٹ تک جاری رہتی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوا سیر کا کیس ہے۔

نسخہ:

Nitric Acid 30 + SI 5 + Nitric Acid 200 + SI 7 bd

7 days

« غذا میں سبزیوں کے استعمال کی ہدایت۔

« گوشت اور مرچوں سے پرہیز۔

دو ہفتے بعد:

اب پاخانہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے لیکن مسوڑھوں کا کالسر دوبارہ ظاہر
ہو گیا۔

نسخہ:

Syphilinum IM 1 dose + SI for 2wks

دو ہفتے بعد:

» بہتری مسلسل جاری ہے۔

» سوزشوں کا اثر مکمل طور پر دور نہیں ہو رہا ہے

نسخہ:

» ایک خوراک Merc Sol IM

» SI دو ہفتوں تک

ایک ماہ بعد:

» مزے کے تمام اثر ختم ہو گئے۔

» پائنتا بازل آ رہا ہے۔

نسخہ:

SI ایک ماہ تک شامل کریں۔

ایک ماہ بعد:

» سب کو ٹھیک ہے۔

« Nitric Acid 1M ایک خوراک اس لیے دی گئی تاکہ بواسیری مسوں کے علاج کو مکمل کیا جائے اور پیشاب میں Urates بننے سے رک سکیں۔
 « پیشاب، پاخانے کا ٹیسٹ کروایا گیا۔

ایک ماہ بعد:

اب بالکل ٹھیک ہیں اور وزن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
 « پیشاب کی جانچ سے معلوم ہوا کہ اس میں Urates نہیں ہیں۔ Pus cell اور ایسوسن بھی نہیں ہے۔
 « تین دن تک کے پاخانے کی جانچ سے معلوم ہوا کہ اب کوئی amoebic cyst نہیں ہے۔
 « موجودہ صورت حال کے مطابق صحت یاب ہو گئے ہیں آخر میں مریض کو سلفر 200 کی ایک خوراک اور SI 15 ایک ہفتے تک دے گئی۔ سلفر 1M اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ اس سے reaction کا خطرہ تھا۔

ڈھائی ماہ بعد:

« مسلسل صحت یابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ السر، مسوں اور amoebiasis کو دور کرنے کے لیے میا زمی رکاوٹ کو Syphilium کی زیادہ پوٹینسی سے دور کیا گیا۔



دوا کی لت

DRUG ADDICTION

« 33 سالہ خاتون، 10 سالہ بچے کی ماں۔

« پچھلے بارہ سال سے Mandxex/ Vesprex کے نشے میں مبتلا ہیں۔ 4 سے 5

گولیاں روزانہ استعمال کرتی ہیں۔

« خاتون گھر میں اکثر اکیلی رہتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں

گزارتے تھے۔ اس لیے خاتون مایوسی اور اکیلے پن کا شکار ہو گئیں۔ کسی طرح سے ان کو

مندرجہ بالا دواؤں کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے استعمال کرنا شروع

کر دیں۔

« انہیں اپنی اس بُری عادت اور اس کے اثرات کا اچھی طرح احساس ہے۔ وہ امیر

خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اسی لیے تعیشات کی وجہ سے زیادہ چلنا پھرنا بھی نہیں پڑتا

ہے۔

« وہ اپنے خاندان سے محبت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کی نشے کی عادت ختم

ہو جائے۔

« رات کو نیند نہیں آتی۔

« انھوں نے چیختے ہوئے کہا کہ "کیا میں اس عادت سے جان چھڑا سکتی ہوں"

« پچھلے چھ دن سے کوئی دوا نہیں لی ہے۔

« وہ اس وقت نکس و امیکا کی بہت اچھی تصویر پیش کر رہی ہیں، لیکن تجویز کرنے سے پہلے

یہ دیکھا گیا کہ مریض چاہتا ہے کہ اسے ایک اچھی زندگی ملے، صحت برقرار رہے، ذہنی

اور روحانی سکون میسر ہو۔ خاتون نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچ لی تھی کہ وہ ضرور

صحت یاب ہو جائیں گی اس لیے نکس و امیکا 200 دی گئی صبح سات بجے اور شام

سات بجے، (ایوینا Q + پیسی فلورا 1:10، پانچ قطرے ناشتے اور 10 قطرے دوپہر

کے کھانے کے بعد اور 20 قطرے سوتے وقت آدھا کپ ٹھنڈے پانی میں)

روزانہ پانچ دن تک۔

« سبزیوں کے استعمال میں اضافہ۔

« پیاز، لہسن اور مرچوں سے پرہیز۔

« دہی اور لسی کا استعمال کیا جائے اور خوش رہنے کی کوشش کی جائے۔

ایک ہفتے بعد:

« بہت بہتری محسوس کر رہی ہیں۔ چہرے سے بٹاش نظر آرہی ہیں۔

« اب انھیں نشے کی بالکل بھی خواہش نہیں ہے۔

« نیند اچھی آرہی ہے۔

نسخہ:

« نکس دامیکا 1M تین خوراکیں۔

« Slu bd سات روز تک

« ایوینا اور پیسی فلورا کے ڈراپس پہلے کی طرح جاری۔

ایک ہفتے بعد:

« خاتون مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں ہیں اب انھیں نشے کی بالکل بھی خواہش نہیں ہے۔ خیند خوب آرہی ہے۔

نسخہ:

« نکس دامیکا 10 M دس دن بعد شام سات بجے ایک خوراک لینا ہے۔

« ایوینا + پیسی فلورا کے قطرے 35ml کی بوتل میں لیکر 5 قطرے استعمال کرتے ہوئے بوتل خالی کر دیں۔

« ہدایت دی گئی کہ اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھیں۔



رحم میں رسولی

ENDOMETRIOSIS

AFTER EFFECTS OF PAN

HYSTERECTOMY

« 33 سالہ خاتون۔

« دو بچوں کی ماں۔

« بچوں کی پیدائش میں ساڑھے چھ سال کا وقفہ ہے۔

« پہلا بچہ نارمل ہوا جبکہ دوسرا بچہ آپریشن کے ذریعے ہوا۔

« دوسرے حمل کے دوران بائیں بیضہ دانی میں ٹیومر بن گیا۔ یہ بڑے سائز کا خونی ٹیومر

تھا۔ آپریشن کے دوران اس ٹیومر کو نکال دیا گیا تھا۔ ایک سال بعد آپریشن کے ٹانگوں

کی جگہ کے نزدیک ایک گٹھی (Lump) بن گئی تجزیے پر معلوم ہوا کہ رحم، فم رحم،

دونوں فلوپین ٹیوب اور بیضہ دانیاں چاکلیٹ جیسے رنگ کے سلعہ (Cyst) میں تبدیل

ہو گئی ہیں

- « سلعہ کا سائز 2.5 سینٹی میٹر ہے جبکہ
- « رحم کا سائز 8cm x 6cm x 4.5cm ہے۔
- « فم رحم پر موجود سلعہ کا رنگ نیلا پڑ گیا ہے۔
- « اندام نہانی میں ایک علیحدہ سلعہ موجود ہے جس میں چاکلیٹی رنگ کا مائع بھرا ہوا ہے۔

جائچ:

- « شدید cerwicitis اور فم رحم (cervix) کا Endometriosis
- « Minimal adenomyosis Uteri
- « Hyperplasia Zona basalis
- « Bilateral endometrial cyst
- « Vaginal endometriosis
- آپریشن کے ذریعے رحم اور بیضہ دانیوں کو نکال دیا گیا اور ایک کپسول Geriatone دن میں ایک بار چھ ماہ تک استعمال کیا۔ اچانک اسی جگہ ایک سخت گٹھی lump نمودار ہو گئی۔ ابتدا میں یہ اس گٹھی lump بہت درد ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے Geriatone کا استعمال کم ہوتا گیا اس میں کمی آ گئی اور اب صرف جگہ کو دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے یہ درد کا کاٹنے جیسا ہوتا ہے۔ اب Geriatone کپسول کے استعمال کو ترک کیے دو ماہ ہو گئے ہیں۔

موجودہ علامات یہ ہیں:

- « مٹانے کی جگہ سے اوپر آپریشن کے نشان کے نیچے ایک سخت گٹھی lump ہے۔
- « چھونے پر درد ہوتا ہے، جو کانٹے جیسا ہوتا ہے۔
- « ذہنی اور جسمانی تناؤ کی وجہ سے آدھے سر میں درد بار بار الٹیاں، کچھ کھا نہیں سکتیں۔
- « نیند کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے۔ آخری دورہ چار روز قبل پڑا ہے۔
- « میٹھا پسند نہیں کرتیں لیکن گرم اور موسمی غذا میں پسند ہیں۔
- « جذباتی، غصیلی، جلد رونا آتا ہے۔

ہسٹری:

- « پہلا حیض 14 سال میں ہوا۔
- « 7 سال کی عمر میں ناسل کا آپریشن ہوا۔
- « خاندان میں اس سے پہلے کبھی ٹی بی (دق سل) کینسر نہیں ہوا
- « 6 سال قبل بائیں ہاتھ کی کلائی پر ٹیومر بن گیا تھا جیسے آپریشن سے نکال دیا گیا۔
- « جلد سفید دھبا بن گیا۔

ظاہری شکل و صورت:

- « رنگ گندمی، دہلی پتی، قد لمبا اور کمزوری

جانچ:

- « دل اور نبض واضح اور باقاعدہ لیکن ہلکی (68) ہے

« بلڈ پریشر کم ہے (105/65)

« خشک اور لگی ہوئی چھاتی۔

« زبان صاف ہے۔

میازم Psora-Sycosis Sycosis acting

« کلائی پر موجودہ چھوٹے ٹیومر کا آپریشن شاید endometriosis کا باعث بنا۔

نسخہ:

« ٹکس و امیکا 200 ایک خوراک رات سوتے وقت۔

« اگلی صبح رسٹاکس 200 ایک خوراک دی گئی۔

(اس سے آپریشن کے پہلوی اثرات دور ہوتے ہیں)

« SI تین دن تک استعمال کرائی گئی۔

« آپریشن کارڈ کے مطابق درج ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔

Indication, Endometriosis, focal and local

Histopathological Reports:

Endometriosis, ovaries, vaginal walls and scar tissues

Adenomyosis of the Uterus

No evidence of malignancy

Operation:

Pan Hysterectomy with removal of endometriosis

focal, in old scar, Vaginal wall and pelvic cavity,

- « ایک ہفتے بعد سخت گٹھی کے سائز میں کمی محسوس ہوئی۔
- « تھو جا 1M بارہ دن تک ایک خوراک رات کے وقت۔
- « SI چار دن تک۔
- « ایسا محسوس ہو (جیسے اونچائی سے گر رہی ہوں)
- « ایک ہفتے بعد بہتری جاری رہی۔
- « آپریشن کے نشان کے پاس گٹھی کا سائز کم ہو گیا ہے۔
- « دھوپ میں شاپنگ کرنے کے بعد تھک گئیں اور (migraine) آدھے سر میں درد ہوا۔
- « کوئی اور علامت سامنے نہیں آئی

نسخہ:

- « SI 14 صبح و شام 7 بجے سات دن تک
- « درد شقیقہ کے لیے 3 Epipegus صبح چار بجے اور صبح نو بجے سات دن تک۔
- « ہدایت دی گئی کہ شاپنگ کے لیے شام کے اوقات میں جائیں اور غیر ضروری محنت اور دماغی محنت سے گریز کریں۔

دو ہفتے بعد:

« lump گٹھی اب بہت چھوٹی رہ گئی ہے۔

« پچھلے روز آدھے سر کا درد ہوا تھا۔

نسخہ:

« Dysentrica Co. 200 ایک خوراک

« Sl 13 bd سات روز تک۔

« Epiphagus 3 کو جاری رکھیں۔

دو ہفتے بعد:

« اب آدھے سر کے درد کی شکایت نہیں ہے۔

« گٹھی میں مزید تبدیلی نہیں ہوئی۔

نسخہ:

« تھوچا 10M 2 گلوبولز کی تین خوراکیں 3 راتوں تک لیں۔

« SI ایک ماہ تک لیں۔

ایک ماہ بعد:

« گٹھی ختم ہو گئی ہے۔

« علاج ختم کر دیا گیا۔

« مریض سے درخواست کی گئی کہ وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہیں۔

7 ماہ بعد اطلاع ملی کہ اب صحت مند ہیں، اس کے بعد تقریباً چھ سال بعد ٹیلی فون پر خاتون نے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں۔



بائیں چھاتی میں گلٹی

FIBRO- ADENOMA OF LEFT BREAST

- « 42 سالہ خاتون
- « شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں
- « 3 بچوں کی ماں آخری بچے کی عمر 18 سال ہے
- « بائیں جانب کے لمبی غدود کے پیرائڈ گروپ پر اثر ہوا ہے۔
- « پہلے بچے کی پیدائش کے بعد بائیں کان کے نیچے ایک چھوٹا غدود بن گیا جس میں درد ہوتا ہے۔
- « یہ غدود اب تک مستقل ہلکا دکھتا ہے اور سوج رہا ہے۔
- « مریضہ اس سے پہلے چھ ماہ تک ہومیو پیتھک علاج کرواتی رہی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
- « بائیں maxillary sinus اور بائیں Nostril بھی بدستور بند ہے۔

- « سر میں بائیں جانب بھاری پن رہتا ہے۔
 « حلق سرخ، پرانا، انفیکشن ہے۔ درد نہیں ہے۔
 « کھانسی خشک، گہری اور درد کے ساتھ ہے۔
 « چھاتی پر اخروٹ کے دانے کے برابر گٹھی lump ہے۔ یعنی بائیں چھاتی کا چوتھا حصہ
 اس کے زیر اثر ہے۔
 « ایکس رے رپورٹ یہ ہے:-

"Architecture of both tissues is altered partially
 defined radio-lucent areas are interspersed b/w
 thickened trabeculae, retro-mammary space,
 sub-cutaneous tissue skin nipple are normal."

"دونوں چھاتیوں کے عضلات کی ساخت تبدیل ہوئی ہے۔ جزوی
 (radio-lucent) جگہیں (جہاں سے ایکس رے گزریں) چھاتی میں موجود درمیانی
 جگہوں اور جلد کے نچلے خلیات میں پھیل گئی ہیں جبکہ جلد اور بھنڈیاں نارمل ہیں۔"

مندرجہ بالا رپورٹ کے مطابق:

Bilateral Fibro-adenosis تجویز کیا گیا۔

« بائیں چھاتی میں fibro-adenoma ایک ہفتے پہلے ہی معلوم ہوا تھا۔
 malignancy سے متعلق کسی رائے کے بغیر اور دونوں چھاتیوں میں خلیاتی
 ساخت میں ہونے والی malignancy کا امکان لگانا ابھی بہت قبل از وقت ہوگا،
 جب تک کہ اس مرحلے پر اس کی جانچ نہ کی جائے۔ قبل از وقت سن یا س ایسے مریض

کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔

« حیض کا دورانیہ تجھے سے سات دن ہے جو نارمل ہے۔ لیکن پہلے تین دنوں میں خون زیادہ آتا ہے۔ حیض شروع ہونے سے قبل چھاتی میں تناؤ اور بھاری پن ہوتا ہے۔
« لوگوں کا ساتھ پسند ہے۔

« وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے ان کا خیال رکھیں۔

« سہانے خواب دیکھتی ہیں۔ جذباتی اور باتونی ہیں۔

« ماں کو آرتھریس (arthritis) ہے اور باپ کو نزلہ کھانسی اکثر رہتا ہے۔

میا زم:

نیو برکلر اور ساٹکوٹک

« درمیانہ رنگ

« درمیانہ قد

« موٹا جسم

جانچ:

نبض، بلڈ پریشر اور دل نارمل ہے۔ بائیں چھاتی میں گٹھی lump ہے گٹھی lump چھوٹی اخروٹ کے سائز کی ہے۔ lump گٹھی سخت ہے۔ اور ہاتھ سے حرکت دینے پر ہلتی ہے۔ بائیں انڈیکس فنگر (انگوٹھے کے برابر کی انگلی) بھی ایک مسامو جو ہے۔

علاج:

بائیں جانب ہونے والی تکلیف کا اثر دائیں جانب بھی پڑتا ہے۔
 « خاتون باتونی ہیں، ان کی عمر کا وقت قبل از سن یاس ہے۔ جو Lachesis کی نشان
 دہی کر رہا ہے۔

نسخہ:

« لیکس 1 M ایک خوراک

« 7 SI 4 دن تک۔

« Becosule ایک کپسول روزانہ ناشتے کے بعد

ایک ہفتے بعد:

مریض کو تمام تکالیف میں بہتری محسوس ہوئی ہے۔
 ذہنی سکون بھی ملا ہے اور بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ گلے کا درد کم ہے۔ بائیں چھاتی پر
 مساب زرم پڑ گیا ہے جس میں ہلکا درد ہے۔

نسخہ:

« 14 bd SI سات دن تک

« جب بھی قبض محسوس کریں، ہائیڈرا سنس 3 قطرے صبح تھوڑے پانی میں لے لیں۔

ایک ہفتے بعد:

« بائیں چھاتی میں سختی ختم ہوگئی ہے لیکن بائیں چھاتی کے آدھے بائیں حصے میں خفیف درد ہے۔ دائیں کان کے نیچے موجود غدود میں درد شروع ہو گیا ہے اگرچہ بائیں کان کے غدود میں کمی آئی ہے اور اب چھوٹا ہو گیا ہے۔

بائیو کیمیک ادویہ فیرم فاس 6x صبح

" " میگنیشیا فاس 6x دوپہر

اور بائیو کیمیک ادویہ فیرم فاس 6x شام

ہر ایک کی چار گولیاں چائے کے چمچے میں گرم پانی میں گھول کر سات دن تک لیتے رہیں۔

ایک ہفتے بعد:

« حیض شروع ہوئے دوسرا دن ہے۔

« اس بار حیض ہر طرح سے بہتر ہوا ہے۔

« بہت زیادہ خون بھی نہیں بہا ہے۔

« حیض سے قبل چھاتی میں کوئی دباؤ یا بھاری پن یا بے چینی نہیں ہوئی ہے۔

« لیکن دائیں کان کے غدود کے درد میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔

نسخہ:

(حیض کے دن ختم ہونے کے بعد یہ ادویہ استعمال کریں)

« لائیو پوڈیم 30 کی 3 خوراکیں پہلی، تیسری اور پانچویں صبح لیتے رہیں۔

« 7 bd SI 7 دن تک

دو ہفتے بعد:

« ہر تکلیف میں بہتری آتی ہے۔ دائیں کان کے ندود کا درختم ہو گیا۔

« دائیں چھاتی سے مس بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی Fibro adenoma کا علاج مکمل ہو گیا۔

« لیکن بائیں کان کے نیچے ایک چھوٹا سا ندود موجود ہے۔

نسخہ:

« ہیتھریلینم 3 IM خوراکیں ہر خوراک دو گلوبولز کی۔ ایک دن تک ہر تین گھنٹے پر۔

« SI ایک مہینے تک۔

« Becosule جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

« بالکل ٹھیک ہیں۔

« دائیں کان کے نیچے ندود کا نشان غائب ہو گیا۔

« علاج مکمل ہو گیا۔

اس کیس میں لیکسیس (Lachesis) مرینڈ کی عادت کے حساب سے اور شفا بخش دوا

کے اعتبار سے بالکل مناسب رہی ہے۔ اس میں مرینڈ کا میازم شامل نہیں ہے۔ لیکن

اس کی خاص علامات کا احاطہ کیا ہے IM پونسی مریضہ کے لیے اثر انگیز پونسی ہے۔

آخر میں یہ مشکل آتی ہے کہ ہم Lachesis سے کیس مکمل کریں یا ہیپیلینم سے جو اس کی متبادل ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ Lachesis مریضہ کے لیے اثر انگیز پونسی ہے اس لیے اس کی پونسی مزید نہیں بڑھا سکتے۔ اس کی متبادل ہیپیلینم کا انتخاب کیا گیا۔ آخر میں ہیپیلینم نے ہیرنگ لاء کو ثابت کر دیا۔



پرانا دمہ

CHRONIC BRONCHITIS

WITH ASTHMA

- « چھ سالہ بچی
- « دو دن پہلے رات دس بجے دمے کا دورہ پڑا۔
- « پہلے سر میں درد ہوا، سانس میں تکلیف ہوئی اور بہت زیادہ کھانسی آئی، گاڑھا سفید لعاب نکلا۔
- « ایلو پیٹھک ادویہ اور انجکشن بھی لگایا گیا جسکے بعد بچی سو گئی۔ اگلے دن صبح آٹھ بجے جاگ گئی۔ دوبارہ زور سے کھانسی آئی جس سے سفید گاڑھا بلغم خارج ہوا۔ پھر بچی نے ناشتہ کیا اور اسکول چلی گئی۔
- « اسکول میں پیشاب بار بار آیا اور دمے کا ایک اور حملہ ہوا۔ رات گئے 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان بستر پر پیشاب کی عادت ہے۔
- « دمے کا حملہ دن 12 سے 1 بجے کے درمیان زیادہ ہوتا ہے۔

- « اور رات 12 سے 1 بجے کے درمیان بھی ہوتا ہے۔
- « موسم کی تبدیلی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
- « منی، دھوپ وغیرہ سے بھی اضافہ ہوتا ہے۔
- « دہلی پتلی اور حساس ہے۔
- « لوگوں میں رہنا پسند کرتی ہے۔
- « آرام کرنے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔
- « 3 سال کی عمر میں پیٹ کے کینروں کا شکار ہوئی تھی۔
- « 4 سال کی عمر میں خسرہ Measles ہو چکی ہے۔ ٹھیک اسکے بعد سے دے کی تکلیف شروع ہو گئی۔
- « دودھ اور پھل پسند ہیں۔ پہلے اور نج پسند تھا لیکن اب نہیں ہے۔
- « گلے میں دائیں جانب غدود بڑھا ہوا ہے۔
- « دل کی حرکت نارمل ہے۔
- « نبض 100 ہے کیونکہ سانس میں دشواری ہوتی ہے۔
- « سینے اور پیچھے دونوں میں درمیانی برانکائی آواز ہے۔ بائیں جانب سے زیادہ آتی ہے۔
- « بھوک کم لگتی ہے۔
- « پیاس اور اجابت اور بڑھوتری نارمل ہے۔

میا ز م:

Psora-Syphilitic

نسخہ:

- « کاربووتج 200 ایک خوراک صبح میں
 « نکس و امیکا 200 ایک خوراک رات میں
 « اگلے دن سے پلساٹیل 30 اور
 « اپنی کاک 30 متبادل دن میں دو مرتبہ صبح، شام سات بجے۔
 « بلڈ رپورٹ کی ہدایت کی گئی ہے۔

ایک ہفتے بعد:

- « تجویز کردہ دواؤں کا بہت اثر ہوا۔
 « سینے اور پیچھے دے دے کے اثرات اور بلغم سے پاک ہو گئے۔
 « بھوک ٹھیک ہو گئی۔

خون کی رپورٹ:

Hb= 13.0, TLC. 7400, DLC: Poly 36

Lympho 54, Eosino 8, Mono 2 and Baso nil.

ESR پہلے گھنٹے میں 30 تھا جو تھوڑا زیادہ تھا۔ ESR اور Eosin کے اضافے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن lympho لمفی خلیات poly کی تعداد کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔

« 4 سال کی عمر میں ہونے والے خسرہ کے حملے کے مقابلے میں اب واضح فرق محسوس

ہوتا ہے۔

نسخہ:

« Morbilineum 200 کی ایک خوراک۔

« Sl₁₃ bd ایک ہفتے تک۔

ایک ہفتے بعد:

« مسلسل بہتری کی طرف گامزن ہیں۔

« سید اور پچھڑے صاف ہو رہے ہیں۔

« پلساٹیل 1 M ایک گلوبول ہر تین گھنٹے پر ایک دن کیلئے۔

« SI 15 دن تک۔

دو ہفتے بعد:

« بستر پر پیشاب آنا بند ہو گیا۔

« ظاہری شکل صورت میں ابھی کمزور ہے۔

نسخہ:

« نیو برکولینم 1 M ایک خوراک

« SI چار دن تک پھر

« بائیو کیمک فیرم فاس 3x صبح میں

« کلکسیر یا فاس 3x شام میں 3 گولیاں گرم پانی میں دس دن تک۔

تین ہفتے بعد:

- « کوئی دورہ نہیں پڑا۔
 « سینہ اور پیچھے صاف ہیں۔
 « وزن بڑھا ہے۔ اب بچی اسکول بھی جا رہی ہے۔

نسخہ:

- « سلفر 200 کی ایک خوراک
 « SI ایک ماہ تک استعمال کر کے علاج مکمل کر دیا گیا۔
 اس کیس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں Morbillinum 200 کا انتخاب کیا گیا جو خسرہ کے جراثیم سے تیار کی گئی ہے۔ بچی کو خسرہ کے بعد سے دمہ ہو گیا تھا۔ Morbillinum نے صرف بیماری کو ہی ختم نہیں کیا بلکہ مکمل شفاء میں مدد دی ہے۔
 « دوسری دوائیں بچی کے میازم اور Constitution ادویہ ہیں۔
 « Tubercullinum اور سلفر سے شفا میں بہت مدد ملی ہے۔
 تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کوئی انفیکشن ہو گیا ہو اور متعلقہ ادویہ سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس انفیکشن کے nosode سے تیار کردہ دوا 200 طاقت میں استعمال کرنے سے جادوئی اثر ہوتا ہے۔



تالو پر زخم، معدے کی تکلیف

FIBRO-HYPERPLASIA OF PALATE

« خاتون، عمر 30 سال

« دو بچوں کی ماں، آخری بچے کی عمر 6 برس ہے

« ان کے منہ میں تالو پر، سامنے کے چھ دانتوں کے پیچھے کولا جن عضلات کی غیر معمولی نمو ہو گئی ہے۔

6 ماہ پہلے کی بائپسی رپورٹ درج ذیل ہے:

نمونے میں ناہموار کولا جن عضلات [collagen] جو ایک سفید عضلہ ہوتا ہے۔

عام طور پر یہ ہڈیوں کے جوڑوں میں پایا جاتا ہے اس میں جلی نما مائع ہوتا ہے [اور

chronic inflammatry خلیات پائے گئے۔

Specimen composed of coarse bands of

callagenous tissues and focal infiltrate of

chronic inflammatory cells. The overlying mucosa
acanthotic

Opinion:

Inflammatory fibrous hyperplasia

5 ماہ قبل مذکورہ خلیات کو تالو پر سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب اس جگہ پر درد نہیں ہوتا لیکن کھانے کے فوراً بعد جلن محسوس ہوتی ہے۔ بائیں طرف اوپر اور نیچے مسوڑھوں میں شدید سوزش ہے۔ گردن کی طرف سختی اور ہلانے میں ہلکا درد ہوتا ہے۔ مریضہ جب لیٹ کر اٹھتی ہیں۔ تو سر میں خون کا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اور دن میں ایک یا دو بار معدے کے منہ پر گرمی کا احساس ہوتا ہے خاص طور پر جب معدہ خالی ہو۔

« سو کر اٹھنے کے بعد تازگی کا احساس نہیں ہوتا۔ سوتے میں خوف ناک خواب نظر آتے ہیں

« حیض نارمل ہے۔ حیض شروع ہوتے وقت چھاتی میں تناؤ ہوتا ہے۔

« مریضہ جذباتی، اور ڈر پوک ہیں۔ اپنی صحت کے بارے میں پریشان رہتی ہیں۔

« قد لمبا ہے، بال کالے ہیں، رنگ درمیانہ ہے۔

میا زم

Tubercular with Sycotic taint

نسخہ:

- « 6 wyethia دن میں تین مرتبہ تین دن تک
 « Sl5 دن میں تین مرتبہ دو دن تک۔
 « Echin تین قطرے نیم گرم پانی میں دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد غرارے کریں۔
 « بلڈ رپورٹ تجویز کی گئی۔

دس روز بعد:

- « کافی حد تک بہتری آئی ہے۔
 « Hb. 12.0, TLC 7,500. DLC: Neutro 44, Lympho 53,
 « Eosino 2. Mono 7, ESR 1st hr. 15, Nodular fungi (++)

نسخہ:

- « تمھو جا 1M 200 اور 30 ہر ایک کی ایک خوراک تین دن تک۔
 « Sl bd 15 دن تک۔
 « Echin Q سے غرغے جاری رکھیں۔
 « Becosule Vit B Complex صبح ناشتے کے بعد ایک کپسول

دو ہفتے بعد:

- « علامات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

نسخہ:

- « سلفر 200 ایک خوراک صبح میں پھر چار دن بعد اگلی دوا
 « بیملینم M 1 دو خوراکیں دو گلوبولز ہر 3 گھنٹے پر ایک دن تک۔
 « SI 15 دن۔
 « Becusule جاری رکھیں۔

تین ہفتے بعد:

- « تالو کا کھر دراپن کم ہو گیا ہے اب تالو ہموار ہو گیا ہے۔
 « کھانے کے بعد ہونے والی درد میں کچھ کمی ہے۔
 « سلیشیا 200 ایک خوراک اگلی صبح
 « فاسٹورس 200 ساتویں دن صبح
 « SI سات دن تک۔
 « Echin Q 2 قطرے چائے کے چمچے دن میں دو بار لیتا ہے۔

ایک ہفتے بعد:

- « تالو میں اب واضح فرق پڑا ہے اور جلن دار درد ختم ہو گیا ہے۔
 « سوزھوں کی سوزش میں کمی آئی ہے۔
 « خیند بھی بہتر آ رہی ہے۔
 « خون کی رپورٹ تجویز کی گئی۔

ایک ماہ بعد:

خون کی رپورٹ:

Hb-11.5, TLC 6.300, DLC Pol 57.

Lympho 34, Mono 8 and Eosino 1

« خون کی رپورٹ اب بالکل ٹھیک ہے۔ مزید علاج روک دیا گیا اور مریضہ کو ڈائمن آئرن وغیرہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔

مریضہ کی علامات کے حوالے سے ریپریٹری تجزیہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی دوائیں سلیشیا اور فاسفورس ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہیں۔ دونوں کا عمل کیس کے مماثل ہے لیکن ان کو استعمال کرنے سے پہلے مریض میں موجود میازم اثرات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تھوجا، سلفر اور پیپیلینم تجویز کی گئی۔ سب سے پہلے سلیشیا کو استعمال کیا گیا کیونکہ مریضہ حساس اور جذباتی ہیں۔ اس کا استعمال عضلات پر بھی ہوتا ہے۔ اسکے بعد فاسفورس کا استعمال کیا گیا۔

« Echin Q (اندرونی) خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی گئی تاکہ تالو کے زخم ٹھیک ہو۔

« فاسفورس بنیادی طور پر خون کے جذبات کو درست رکھنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔



پیشاب کا انفیکشن

URINARY INFECTION

« خاتون، عمر 61 سال۔

« بار بار پیشاب آنے کی شکایت۔

پیشاب کی رپورٹ:

Albumin ++, sediment present, blood present, pus
cell 15-20, RBC over 100 and 3-5 Epicell perfield
کچر کرنے پر معلوم ہوا کہ E-coli کا انفیکشن ہے۔ (Furadantin) E-coli
کے لئے حساس ہے۔ Furadantin سے علاج کے بعد RBC اور
Epithelial cells ختم ہو گئے ہیں۔

PUS خلیات 6 سے 8 ہیں۔

ایک ہفتے بعد خون کی رپورٹ:

Hb= 11.5, RBC=3.98 million, TLC 10,000, DLC

Neutro 68, Others normal, Showing mild neutrophilia.

خون اور پیشاب کے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ مریضہ کو شوگر بھی ہے۔ یعنی اب شوگر اور بار بار پیشاب کے انفیکشن کا علاج کرنا ہے۔

ان کی مزید علامات:

- « صبح میں 1 سے 2 پتلے پاخانے۔
- « معدے میں ہوا اور درد۔
- « چلنے سے تھک جاتی ہیں۔
- « بیماری سے بہت حساس ہیں۔
- « سن یا اس نارمل ہوا ہے۔
- « دیکھنے میں مضبوط جسم ہیں۔
- « رنگ صاف ہے۔
- « جسامت چھوٹی ہے۔
- « جسم میں کوئی نخ یا خرابی نہیں ہے۔
- « دل صحت مند ہے۔
- « دانت کی وجہ سے دھنی پریشانی ہے اس لیے ڈائسٹالک Diastolic پریش
- « ذرا سا زیادہ ہے۔

میا ز م:

Psora-Sycotic

نسخہ:

« نکس و امیکا 200 رات سوتے وقت ایک خوراک
 « ہپہر سلف 200 3 خوراکیں متبادل دنوں میں صبح کے وقت
 « Shu bd سات دن تک۔

تین ہفتے بعد:

« بہتر محسوس کر رہی ہیں۔
 « معدے میں دوپہر کھانے کے بعد گیس بن جاتی ہے
 « پیشاب گدلا آ رہا ہے۔

نسخہ:

لائیکو پوڈیم 6 صبح سات بجے
 بر بیرس 6 شام سات بجے
 روزانہ سات روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

« معدے کی تکلیف میں کمی آئی ہے
پیشاب کی رپورٹ:

Albumin + Sugar. nil,

RBC 3-4 Epi 5-10 Pus 50-100

نسخہ:

« تھو جا 1 M ایک خوراک رات کو سوتے وقت SI 12 جاری رکھی جائے۔

ایک ہفتے بعد:

« بہتر محسوس کیا ہے۔

« پاخانہ بہتر ہوا ہے۔

نسخہ:

تھو جا 1M ایک خوراک رات سوتے وقت

ایک ہفتے بعد:

« نسخہ جاری ہے۔

ایک ہفتے بعد:

وہی نسخہ اور SI پندرہ دن تک

ایک ہفتے بعد:

پیشاب کی رپورٹ:

Urine Clear, Pus cells 10-15, other normal

نسخہ:

« SI ایک ماہ کے لیے تجویز کی گئی
اور ہدایت کی گئی کہ جب بھی پیشاب میں Pus خلیات موجود ہوں تو معائنہ
کروائیں۔

ایک ماہ بعد:

« Pus cells میں اضافہ ہوا ہے۔

« 20-40 per field

RBC = 3-5. Epi = 3-5

نسخہ:

« تھو جا IM 4 خوراکیں۔ ایک خوراک ہفتے میں ایک دن رات سوتے وقت چار
ہفتوں تک لینا ہے۔

« SI ایک ماہ تک لینا ہے۔

« وٹامن بی کمپلیکس اور وٹامن سی ناشتے کے بعد لینا ہے۔

دو ماہ بعد:

پیشاب کی رپورٹ:

Urine clear, epithelial cells 1-2

نسخہ:

« تھو جا IM 3 خوراکیں ماہانہ وقفہ سے رات سوتے وقت

« اسکے بعد علاج بند کر دیا گیا۔

اس کیس میں تھو جا IM کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا جس سے E-coli انفیکشن دور کیا گیا۔



گھٹنوں کا درد، کم بلڈ پریشر

PAINFUL KNESS

WITH LOW BP

« غیر شادی شدہ خاتون

« عمر 31 برس، پیشہ: سنگر اور ڈانس ٹیچر

دونوں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ جسکی وجہ سے ڈانس نہیں کر پاتیں۔ عنقریب کئی پروگراموں میں پر فارم کرنا ہے۔ ان کو خدشہ ہے کہ ان پروگراموں میں شرکت نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے بہت ٹینکین اور فکر مند ہیں۔ ایلو پیتھک ادویہ سے افادہ نہیں ہوا۔ ان کی خواہش ہے کہ ایک ماہ کے اندر تکلیف دور ہو جائے۔

علامات:

« دونوں گھٹنوں میں درد

« حرکت یا دباؤ ڈالنے سے اضافہ ہوتا ہے۔

« میز حیاں چڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

- « کھنے جسم کا وزن برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔
- « روزانہ شام کے وقت رانوں میں ہلکا درد شروع ہوتا ہے جس سے دونوں کھنے متاثر ہوتے ہیں
- « پچھلے 6 ماہ سے گلا خراب ہے آواز میٹھی ہوئی ہے۔
- « غذا نگلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔
- « آواز کی ورزش کرنے سے آواز اور خراب ہو گئی۔
- « سر میں درد
- « نظر دھندلائی ہوئی ہے۔ پڑھنے سے یا کوئی بھی کام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔
- نسخہ:

مندرجہ بالا علامات سے رس ٹاکس بنتی ہے۔ یہ مماثل دوا ہے۔ اس کیس میں پہلے سلفر کا استعمال کروایا گیا کیونکہ مریض کا میازم سورا تھا۔ اس طرح علاج کے لیے جگہ بنی۔ رس ٹاکس میں کمزور نظر، درد سر اور ذہنی علامات بھی کور ہو گئیں۔ مریضہ کو صرف رس ٹاکس 1M کی ایک خوراک کی ضرورت ہے۔

ہائڈرائٹس اور چلیڈونیم کی مدد سے اجابت کی تکلیف کو دور کیا گیا ان دونوں ادویہ نے جگر سے صفرا کی فراہمی کو بڑھایا۔

بائیو کیمک نمکیات بلڈ پریشر بڑھانے کے لیے استعمال کیے گئے۔

ڈانس کے بعد آر نیکا کا استعمال اس لئے کیا گیا تاکہ دوران ڈانس ہونے والے زخم یا تکلیف کو دور کیا جاسکے۔ آر نیکا رس ٹاکس کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔

Fer Phos 12x + Calc Phos 6x+ Kali Phos 6x

دو گولیاں چوتھائی پیالی گرم پانی میں حل کر کے ڈانس کرنے سے پہلے اور بعد میں پی لیں۔ اس طرح خون کے بہاؤ میں بہتری اور عصاب کو طاقت ملے گی۔

دو ماہ بعد:

- « اب بالکل ٹھیک ہیں۔ تمام عرصے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔
 « علاج بند کر دیا گیا ہے۔
 یہ کیس کینٹ ریپرنری کے چھٹے ایڈیشن سے ریپرنائز کیا گیا ہے۔

علامات یہ ہیں:

- « حلق۔ درد۔ (464)
 « آواز۔ زیادہ استعمال سے بیٹھ گئی۔ (760)
 « گھٹنے میں درد (1072)
 « دباؤ سے درد (1383)
 « راتوں میں درد 4-8 pm کے درمیان
 « حرکت سے تکلیف میں اضافہ (1358)
 « ٹانگوں کو کراس کرنے سے تکلیف
 « ذہن۔ سوچ۔ پریشانی۔ غمگین۔

ایک ہفتے بعد:

- « خاتون بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں۔

« جسم میں طاقت محسوس ہو رہی ہے۔

« بلڈ پریشر 70 / 115 ہے۔ خاتون نے بتایا کہ وہ دودن بعد ڈانس میں حصہ لے رہی

ہیں۔ انھوں نے مجھے بھی اس پارٹی میں مدعو کیا۔

بایو کیمک نسخہ جاری رہا اور ہدایت کی گئی کہ ڈانس سے پہلے اور بعد میں ضرور استعمال

کریں۔ اس کے بعد اگلی صبح آرنیکا 1M ایک خوراک لیں۔ اور BP فارمولا

دن میں تین بار روزانہ۔

دودن بعد:

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بہت اچھی طرح ڈانس کر رہی ہے۔ وہ بہت

اچھی طرح اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔

دو ہفتے بعد:

« بالکل ٹھیک ہیں

« بلڈ پریشر 80 / 120 بالکل نارمل ہے۔

« ایک مہینے کے لیے ملک سے باہر فن کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔

نسخہ:

رس ٹاکس 1M اور آرنیکا 1M ایک ایک خوراک ہر ہفتے دو ہفتے تک۔

ایک ہفتے بعد:

« اجابت نارمل ہے۔

« نبض 80 اور ریگور ہے۔

« بلڈ پریشر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

« پچھلے نسخے میں بائیو کیمک فارمولے کا استعمال اس لیے کیا گیا تھا تا کہ بلڈ پریشر میں اچانک کمی نہ ہو سکے۔

بائیو کیمک فارمولا:

Nat Phos 6x + Kali Mui 6x

Calc Phos 6x + Kaliphos 6x

ہر ایک کی دو گولیاں چوتھائی کپ گرم پانی میں ہر چار گھنٹے بعد دن میں چار مرتبہ سات دن تک لیں۔

ایک ہفتے بعد:

« بلڈ پریشر میں اضافہ ہوا

« اگرچہ 5mm کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے نسخے نے عمل کیا ہے۔ یہی نسخہ ایک ہفتہ مزید جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

« بہتر محسوس کر رہی ہیں

« درد سر اور نظر کا دھندلا پن ختم ہو گیا ہے۔

« بلڈ پریشر کم ہے۔

« گھنٹے کی تکلیف جاری ہے۔

نسخہ:

« رس ٹاکس 1M 3 خوراکیں ہر بار دو گلوبولز پہلے دن ہر تین گھنٹے پر۔

« SI 12 دن میں دوبارہ 6 دن تک۔

« ساتھ میں اوپر بیان کردہ ہائیڈوکیمک ادویہ

ایک ہفتے بعد:

« اب گھنٹے کا درد کم ہے۔

« بلڈ پریشر بہتر ہے 65/105

نسخہ:

فیرم فاس 6x صبح سات بجے۔

کالی فاس 6x شام سات بجے۔

ایک خوراک میں چار گولیاں چوتھائی کپ گرم پانی میں حل کر کے پی لیں۔

« ہائیڈرائس Q، جیلی ڈونیم Q { 3 قطرے چائے کے چمچے بھر پانی میں صبح سات

بجے اور شام 5 بجے سات دن تک استعمال کریں۔

« اجابت نامکمل، صبح کے وقت کم۔

« حیض نارمل۔

« ذہن، سوچتی زیادہ ہیں، پریشان اور غمگین رہتی ہیں۔

ہسٹری:

- « 1982 میں ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا اور
 « ٹھنڈک سے الرجی بھی رہتی ہے۔
 « والدین نارمل ہیں۔

معائنہ:

- « رنگ صاف۔
 « جسمانی ساخت بہت اچھی۔
 « بلند پریشر کم ہے 60/100

میازم:

Psora

نسخہ:

سلفر 200 ایک خوراک صبح کے وقت 3 دن تک
 « چوتھے دن سے

Calc phos 6x + Kali Phos 6x + Nat Mur 6x

ہر ایک کی دو گولیاں چوتھائی پیالہ گرم پانی میں حل کر کے پی لیں۔
 چار دن تک دن میں 3 مرتبہ۔



پرانا موروثی دمہ

CHRONIC HEREDITARY

ASTHMA

« مرد عمر 31 برس

« گلے کی پرانی تکلیف

« سانس لینے میں تکلیف، سیر حیاں چڑھتے ہوئے تکلیف میں اضافہ، نفی کے موسم میں اور موسم کی تبدیلی میں، آدھی رات کے بعد یعنی 1-4 am تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

دہنی علامات:

« سنجیدہ، لوگوں میں ساتھ بیٹھنا پسند ہے سہانے خواب آتے ہیں۔

« Ventolin inhaler اور Tredral ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔

ہسٹری:

دے کا سب سے پہلا شدید حملہ 25 سال کی عمر میں دن کے وقت ہوا۔ یہ حملہ بہت اچانک تھا اس لیے انھیں ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ Adrenaline انجکشن سے کنٹرول کیا گیا۔ بچپن سے گلے کی بیماری رہی ہے اور اسکے بعد دے کی، اسکے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں ہوئی ہے۔

فیمیلی ہسٹری:

والد شوگر کے مریض ہیں اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہے والدہ کو شدید دمہ ہے خاندان میں بی بی یا کینسر کبھی نہیں ہوا۔

ظاہری حالت:

مضبوط جسم، درمیانہ قد صاف جلد

معائنہ:

ٹانسل نہیں ہیں لیکن بائیں ٹانسل پر ایک چھوٹی سی اضافی نمو (growth) ہے
حلق میں کھجلی سی ہوتی ہے زبان صاف ہے، دل ٹھیک ہے، نبض تھوڑی تیز ہے
کیونکہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔
سگریٹ نہیں پیتے ہیں شراب کبھی کبھی پی لیتے ہیں۔

میازم:

Syco-Syphilitic

psora in the background.

نسخہ:

پلسا ٹیلا 7,30 خوراکیں اور آرسنیک 6,30 خوراکیں دوسرے دن سے۔
 ٹیلا ڈونا آج شام 7 بجے 4 + 4 + 2 + 2 + 1 خوراکیں روزانہ
 Echnecea Q + Calendula 1:1 سے غرغری کریں آدھا کپ
 گرم پانی میں 3 سے 4 قطرے لیکر صبح اور رات سوتے وقت غرغری کریں۔
 Tedras ٹیبلٹ کا استعمال بند کر دیا گیا ہے۔

Ventolin Inhaler استعمال کیا جاسکتا ہے۔

بیگن، لال گوشت، پیاز اور ک، کافی، شراب چٹ پنی اور تلی ہوئی اشیاء سے اجتناب۔

ایک ہفتے بعد:

« بہتر محسوس کر رہے ہیں دایاں سینہ، پیچھے کچھ اثر انداز ہوئے ہیں۔ بائیں سینے
 اور پیچھے دونوں میں Rochi بدستور جاری ہے۔

نسخہ:

« SI « دو دن تک پھر

« 1.0M Nat Sulph 3 خوراکیں ہر خوراک میں دو گلوبولز ہر تین گھنٹے پر ایک

دن تک استعمال کریں۔ اور 12 bd SI 6- روز تک ان کو اگلے ہفتے سفر پر جانا ہے اس لیے انھیں مندرجہ ذیل ادویہ استعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔

« SI دو دن تک

« آرسینک 1M 3 خوراکیں 2 گلوبولز ہر تین گھنٹے پر ایک دن اور پھر SI چار دن تک۔

« کلکیر یا 30 3 خوراکیں ساتھ میں bd SI دو دن تک

« اسکے بعد 6x bd Calc Ars چار روز

« پیسلینم 1M ایک خوراک + 13 bd SI سات روز تک۔

ایک ماہ بعد:

« سینہ اور پیچھے صاف ہو گئے ہیں۔

« اب سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔

« لیکن رات 4-1 بجے کے قریب حملہ ہوتا ہے صبح تک جاری رہتی ہے۔

نسخہ:

« سفلینم 1M 3 خوراکیں ہر ایک دو گلوبولز ہر تین گھنٹے پر ایک دن اور SI

پندرہ دن تک استعمال کریں۔

ایک ماہ بعد:

« رات میں ہونے والا حملہ ابھی باقی ہے لیکن کچھ کمی ہے۔

نسخہ:

« سلفر 200 ایک خوراک اور SI 13 سات روز تک

ایک ہفتے بعد:

« ٹھنڈے موسم میں رہنے کی وجہ سے دن کے وقت تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی ہے،
رات کی تکلیف میں کچھ کمی ہے۔

نسخہ:

« آرسینک 30 3 خوراکیں اور پلساٹیل 30 3 خوراکیں 3 دن تک۔

تین دن بعد:

« سینز اور پیچھڑے صاف ہیں۔ رات کی تکلیف میں برداشت کے قابل کمی ہو گئی
ہے۔

نسخہ:

« سفلیئم 10 M 3 خوراکیں 2 گلوبولز ہر تین گھنٹے پر ایک دن۔

« SI تین ہفتے تک۔

تین ہفتے بعد:

اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ سفلیئم 6 CM ہفتے بعد لینا

ہے اسکے بعد علاج بند کر دیا گیا۔

اس کیس کی خاص بات یہ ہے کہ مریض گلے کی پرانی تکلیف اور دے میں جٹا ہے جو کما سے ورٹے میں ملی ہے اسے صرف 25 سال کی عمر میں دے کا پہلا حملہ ہوا۔ دن کے وقت تکلیف میں زیادتی کی وجہ سے Inhaler Ventolin استعمال کرنا پڑا موسم کی تبدیلی سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ ان تمام نکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میازم Sycotic ہے جو Syphilitic سے زیادہ ہے جب سائیکوٹک عنصر زیادہ ہو اور سفلیٹک عنصر کم ہو تو مریض بہت واضح تصویر پیش کرتا ہے کہ رات میں ایک سے چار بجے کے دوران تکلیف بڑھتی ہے۔ اس طرح سفیلنم سے مرض کو کنٹرول کیا یہ کتاب لکھتے وقت مریض سے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پچھلے آٹھ سال سے بالکل ٹھیک ہے۔



تکلیف دہ حیض کی کثرت

PROTRACTED

HEAVY MENSES

بیوہ خاتون تین بچوں کی ماں عمر 39 برس
حیض میں خون بہت زیادہ بہہ جانے اور کمزور کر دینے والی تکلیف کے لیے تشریف
لائیں

خاتون نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کا بزنس سنبھال لیا۔
15 دن پہلے ہونے والی ماہواری (menses) کے بعد اب تک خون بہہ رہا تھا
دو ماہ قبل DNC ہوئی تھی اور ان کی گائناکولوجسٹ نے Premoluten تجویز
کیا تھا۔ یہ ایک ہارمون ہے جو کچھ عرصے سے استعمال کر رہی ہیں۔ انھوں نے بتایا
کہ ان کی حالت DNC اور ہارمون لینے کے بعد بگڑ گئی ہے۔
پچھلی بار ان کی ماہواری کی مقدار زیادہ تھی لیکن 7 سے 8 دن میں ختم ہو گئی تھی
انھوں نے مندرجہ ذیل علامات بتائیں:

« حیض بے رابطہ، جلد، پیٹ کے نچلے حصے میں بے پستانی، گاڑھا، اال، گہرا۔ اور اب خون کے لوتھوے بھی آرہے ہیں۔ کوئی درد نہیں ہے۔ کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، سفید، دہیسیں ہے۔ دائیں ٹانگ میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور باقی جسم میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ 6 مہینے سے Discharge کے وقت متلی ہوتی ہے نفس ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔

« رحم fibroid نہیں ہے۔ کوئی malignancy نہیں ہے ایسا محسوس کرتی ہیں جیسے کوئی چیز نیچے آرہی ہے۔

کمر کا درد:

آخری بچے کی پیدائش سے اب تک کمر میں درد ہوتا ہے۔

شور : برداشت نہیں کر سکتیں۔

سر : سر میں بھاری پن ہے۔

دانت : دایاں اور بایاں پر filling کر داتی ہیں۔

خواب : مرے ہوئے لوگوں کے خواب اور گھرتیل کرنے کے خواب آتے ہیں۔

روز آہ : دس کپ کڑک چائے پیتی ہیں۔

ذہن : ہمدردی پسند نہیں کرتیں تاہم دوسروں کے ساتھ ہمدرد ہیں۔

ہسٹری:

« پہلا حیض 12 menses سال کی عمر میں ہوا۔

« 21 سال کی عمر میں شادی کی۔

« پہلا بچہ 22 سال کی عمر میں۔

« آخری بچہ 29 سال کی عمر میں۔

فیملی ہسٹری:

والد اور ان کے خاندان کے لوگ دل کے دورے سے اور بہت کم عمر میں فوت ہوئے
مثلاً والد 42 سال کی عمر میں تانی گلے کے کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ پھوپھی کوئی
بی تھی۔ والدہ کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔

ظاہری علامات:

صاف رنگ، بھاری لیکن بہت موٹی نہیں ہیں۔ درمیانہ قد، کمر موٹی ہے۔

معائنہ:

دل اور نبض نارمل ہے BP 110/65 زبان صاف، ٹانسل نہیں ہے مولر دانت

میں filling -

میازم:

Psora- sycosis Psora aching

نسخہ:

« آرنیکا 1M ایک خوراک

« شام چار بجے سے برد گھسنے پر Thlaspi and Fr. Americana Q

ایک کے دس قطرے متبادل برد گھسنے پر کھانے کے چمچے میں گرم پانی کے ساتھ
صرف آج لیتی رہیں اور کل سے ہر چار گھنٹے بعد چار روز تک لینا ہے۔

vit B Complex, Surbex T ایک گولی ہر ناشتے کے بعد

ایک ہفتے بعد:

خون کا اخراج اب بالکل نہیں ہے جبکہ سر کا بھاری پن باقی ہے۔ ظاہری بہتری ہوئی
ہے۔

نسخہ:

« چائنا 1M ایک خوراک

« SI 6 ہر صبح

Fr. Americana Q 10 قطرے صبح گیارہ بجے اور رات سونے سے پہلے

رات دن تک۔

ایک ہفتے بعد:

خون کا بہاؤ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ سر کا بھاری پن اور کمزوری بھی ختم ہو گئی ہے۔ مریض نے پرانی علامت کا انکشاف کیا کہ دائیں بازو کی پچھلی ہڈی Scaple سے لے کر بازو سے ہوتا ہوا دائیں سینے تک درد ہوتا تھا، یہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔

نسخہ:

« چیلی ڈونیم 30 3 خوراکیں۔

« Sl 7 bd پانچ دن

« Fr. Americana Q 5 قطرے دوبار جیسے پہلے لیے تھے

« Surbex T جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

درد دور ہو گیا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔

« چیلی ڈونیم 200 ایک خوراک

« Sl 13 bd سات روز تک

« Fr. Americana Q دوبار پہلے کی طرح۔

ایک ہفتے بعد:

جیفس شروع ہوا ہے۔

« Fr. Americana Q کا استعمال بند کر دیا گیا۔

« آرام کی ہدایت کی گئی۔

ایک ہفتے بعد:

حیض نارمل ہوئے اور 6 دن میں ختم ہو گئے دوسرا اور تیسرا دن زیادہ بھاری تھا۔

« چائنا IM

« SI پندرہ روز کیلئے

تین ہفتے بعد:

اب بالکل ٹھیک ہیں

علاج بند کر دیا گیا

یہ کیس جادوئی شفاء کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ گائنا کولو جسٹ نے جو DNC کی اور ہارمون استعمال کروائے تھے وہ 4 ماہ تک کوئی آرام نہیں دے سکے بلکہ مریض کی تکلیف میں اضافہ کرتے رہے۔ لیکن ہومیو پتھی نے صرف 4 روز میں یہ مسئلہ حل کر دیا۔



پرانا نزلہ

CHRONIC COMMON COLD

مرد، عمر 39 برس۔

بچپن سے مزمن (کراٹک) نزلہ ہے۔ ساتھ میں ناک کی ہڈی بھی اٹھی ہوئی ہے۔ ناک کی ہڈی کے لئے آپریشن کیا گیا تھا تا کہ ناک سے رطوبت کا اخراج آسانی سے ہو سکے۔ عام طور پر ان کی رطوبت گاڑھی سفید ہوتی ہے لیکن جب اچانک نزلہ شروع ہوتا ہے تو چھٹکیں آتی ہیں اور نزلہ بہتا ہے۔ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور ناک بند ہو جاتی ہے۔ ان کی دوسری علامات درج ذیل ہیں۔

۱۔ Chronic Rhinitis ساتھ میں Sinuses

۲۔ تین چار سال سے معدے میں درد اور دن بھر ریاح کا اخراج ہوتا ہے۔ ہوا کے اخراج سے آرام ملتا ہے

۳۔ 6 سال سے مبرز anus میں کھجلی ہے۔

۴۔ نزلے کی صورت میں کبھی کبھی درد دسر ہوتا ہے۔

۵۔ دہسکی پیتے ہیں اور 25 سے 30 سگریٹ روزانہ پیتے ہیں۔

ذہنی کیفیت:

- « بہت حساس ہیں۔
 « اپنے پرانے نزلہ کے لیے فکر مند ہیں۔
 « لوگوں میں بیٹھنا، رہمداری پسند ہے۔
 « سفر کرنا اور کام کرنا پسند ہے۔

ہسٹری:

- « 8 سال کی عمر میں خسرہ Chicken pox
 « Hydrocele آپریشن 16 سال کی عمر میں۔
 « ناک کی ہڈی کا آپریشن کیا گیا تھا۔

فیملی ہسٹری:

- « والد 68 سال کی عمر میں دل کے دورے سے فوت ہو گئے۔
 « ماں کے چہرے پر جلدی بیماری ہے۔

ظاہری:

- « بہت صاف رنگ۔
 « درمیانہ قد۔
 « بسم اچھا، صحت مند ہے۔

معائنہ:

زبان صاف، دل اور نبض نارمل۔ بلڈ پریشر نارمل فائل نہیں ہیں۔
سوائے پرانے نزلے کے اور پیٹ کی خرابی کے کوئی اور فعلیاتی نہیں ہے۔

میازم:

Tubercular with Syphilitic faint Psora in background.

علاج:

اب وہ اپنی اس تکلیف سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ ناک کی جڑ میں درد
سے صبح کے اوقات میں ناک صاف کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔

نسخہ:

“ 1 M Nux vom آج شام تا کہ سگریٹ نوشی کے اثر کو زائل کیا جاسکے۔

“ 200 Kali bichro 3 خوراکیں تین دن صبح کے وقت۔

“ SI 11 bd سات روز تک۔

“ مشورہ دیا گیا کہ سگریٹ نوشی کم کریں اور Vit-C کی ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال
کریں۔

ایک ہفتہ بعد:

“ شدید عام نزلے کا اخراج جو اب سفید گاڑھا ہو گیا ہے جسے باہر نکالنے کی ضرورت

ہے۔

« سین اب درد نہیں ہے۔

« پیٹ کی تکلیف دوپہر کے کھانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے ساتھ میں anus پر کھجلی بھی ہوتی ہے۔

« کاربوئیج 30-5 خوراکیں۔

« انیکلوپوڈیم 30-4 خوراکیں۔

« اور Sl's سات روز تک صبح سات بجے اور رات 9 بجے روزانہ۔

ایک ہفتے بعد:

« اب طبیعت بہتر ہیں۔

« دوپہر کے کھانے کے بعد ہونے والی پیٹ کی تکلیف میں کمی ہے اور مبرز پر کھجلی بھی کم ہے اب وقت ہے کہ پرانے نزلے کے لیے گہرائی میں اثر کرنے والی دوا کا استعمال کیا جائے۔

نسخہ:

« سلفر 200 ایک خوراک۔

« Sl 7 bd 4 دن

« پھر 1M Tuberculinum ایک خوراک ساتھ میں Sl پندرہ روز تک۔

پندرہ دن بعد:

« شدید نزلے میں کوئی خاص کمی نہیں آئی سوائے اسکے کہ Sinusitis میں اضافہ نہیں ہوا

« بہر حال اب مبرز میں کھجلی نہیں ہے۔

نسخہ:

« ہسپر سلف 1M, 200, 30 صبح شام اور اگلی صبح لینا ہے اور پندرہ روز تک SI لینا ہے۔

پندرہ دن بعد:

« اب وہ بہت حد تک بہتر ہیں۔

« SI 15 دن تک استعمال کریں۔

پندرہ دن بعد:

« مسلسل بہتری ہو رہی ہے۔

« آخر میں ہسپر سلف 10 M دے کر کیس بند کر دیا گیا۔

بار بار شروع ہو جانے والے امراض کو شفاء دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کیس

کامیابی کے ساتھ شفا پا گیا۔ تمباکو کا استعمال اکثر ہومیو پیتھک ادویہ کے عمل کو روکتا

ہے۔ اسلئے اس کیس میں 1M Nuxvom سے علاج شروع کیا گیا ہے۔ نمس

وامیکا سے معدے کا فعل بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسری ادویہ کالی بائی کروم، کاربوونج،

لائیکوپوڈیم مریض کی علامات کے مطابق دی گئیں اور سب نے بہت اچھا عمل کیا۔

کاربووج اور لائیکو نے flatulence کو کور کیا اور Phatak's ریپریٹری کے PP
141 اور 14 صفحے کے مطابق یہ دونوں ادویہ anus میں کھلی کو بھی کنٹرول کرتی

ہیں۔ مریض کی Constitutional Tuberculinum ہے جبکہ

« ہسپرسلف (جو anti Syphilitic اور anti Psonic دوا ہے۔)

پرانے شدید نزلے کو شفا دی اسکے علاوہ ہسپرسلف نے مریض کی غیر ضروری
حساسیت کو بھی کنٹرول کیا۔ آج تک اطلاع کے مطابق وہ صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔



پرانی جلدی خارش

CHRONIC SKIN ERUPTION

(Every Summer)

مرد عمر 27 سال، جلدی بیماری

بچپن میں وہ دسے میں مبتلا تھے جو ایڈرینالین کے انجکشن کورس سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب انکے پورے جسم میں خارش ہو رہی ہے دو سال قبل انھیں انگلیوں، جوڑوں اور دوسری جگہوں بشمول پوشیدہ اعضاء پر خارش ہو گئی تھی جسے مرہم Scabies and antihistamine کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا۔ اس کے بعد انکو خشک خارش شروع ہو گئی جو ہر موسم گرما میں تنگ کرتی ہے۔ دوسری علامات درج ذیل ہیں۔

الرجک نزلہ:

” اسکا حملہ ہر صبح ہوتا ہے رات میں نیند پوری نہیں ہوتی ہے صبح چار بجے آنکھ کھل جاتی

ہے۔

« ناک میں سے مواد خارج کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ یہ مواد انڈے کی سفیدی جیسا ہوتا ہے۔

« جب زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جھنجھاٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دن بھر ٹھیک رہتے ہیں۔

« جسم کے اوپری حصے میں کھلی گرمی سے بڑھ جاتی ہے۔

پسینہ:

« خاص طور پر سورج کی گرمی سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ تھوڑی بھی محنت کا کام کرنے سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔

« ہاضمہ کمزور ہے۔ ریاح کا اخراج آواز سے ہوتا ہے

نیند:

خواب سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ رات ایک سے ڈیڑھ بجے تک نیند آنا شروع ہوتی ہے اور صبح 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی لیے سونے کے بعد تازہ دم نہیں ہو پاتے ہیں۔

« ذراؤ نے خواب آتے ہیں جس سے چیخ نکل جاتی ہے۔

« ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔

« جلد حساس ہے۔

« ایڑھی میں پردرد شکاف ہیں جو سردیوں میں زیادہ تکلیف دیتے ہیں جسکی وجہ سے ڈانس میں مشکل ہوتی ہے۔

ذہن:

حساس اور ہمدردی پسند ہے۔

ہسٹری:

ٹھنڈک سے حساس، دمہ 9 سے 15 سال کی عمر میں۔ یرقان 24 سال کی عمر میں اور بلیریا 27 سال کی عمر میں ہوا تھا۔

فیمیلی ہسٹری:

تین سال پہلے ماں نے خودکشی کی ہے

ظاہری:

قد لمبا۔ رنگ صاف، جسم سڈول

معائنہ:

جلد پر کھجلی۔

میازم:

Psora-Syphilitic

Psora in active stage

نسخہ:

سلفران کی مماثل دوا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے سلفر سے کیس شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرناک حد تک رد عمل ظاہر کر سکتا ہے اور مریض کا دمہ واپس آ سکتا ہے اور ان کی جلدی بیماری بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اسلئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مریض کا علاج علامتوں کے لحاظ سے شروع کیا جائے۔ جب تک کہ کیس سلفر کیلئے موضوع نہ ہو جائے، سلفر استعمال نہ کی جائے۔ Tuberculinum بھی اس کیس میں ضروری ہے۔

« اینٹی مونم کروڈ 6 کی 14 خوراکیں bd Sl سات روز تک Passi inc Q 20 قطرے چوتھائی پیالہ پانی میں رات سوتے وقت سات روز تک استعمال کریں۔

ایک ہفتے بعد:

« جلد پر واضح تبدیلی ہوئی ہے۔

« Sl 10 + اینٹی مونم کروڈ 30 تین خوراکیں Sl bd سات روز تک۔

« 1:1 Calen Q + Echin Q مرہم ایڑھی کے شکافوں میں تین، چار دن لگائیں۔

« Vit B روزانہ ناشتہ کے بعد ایک گولی۔

ایک ہفتے بعد:

« • نیند میں بہتری ہوئی ہے۔

« ایڑھی کے شکافوں میں ورد کم ہوا ہے۔

نسخہ:

« اینٹی مونم کروڈ 200 ایک خوراک Sl s bd تین دن Echin Q (اندرونی)

دو قطرے چائے کے چمچے بھر پانی میں دن میں چار مرتبہ جس سے خون صاف ہوگا اور
اب سلفر کیلے جسم تیار ہو جائیگا۔

« Echin Q مرہم جاری رکھیں۔

« Vit کا استعمال جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

« سیدھے ہاتھ اور دوسرے ڈھکے ہوئے حصوں پر خارش برقرار ہے۔

نسخہ:

« Tuber 1M ایک خوراک

« Sl s bd تین دن تک

« Echin Q قطرے دن میں چار مرتبہ۔

« Vit اور مرہم جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

« جلد بہت بہتر ہے

« خارش ابھی نہیں گئی ہے۔

« خیند میں بے چینی ہے۔

« سونے کے عرصے میں اضافہ ہوا ہے۔

« 11 بجے رات سے چار بجے تک

« ڈراؤنے خوابوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

نسخہ:

« لائیو 30 3 خوراکیں ہر چوتھی صبح سات بجے

« Sl 11 bd سات روز تک

« Echin Q قطرے اب دن میں دو بار

« وٹامن اور مرہم جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

« ہاضمہ اور ریاح کا اخراج بہتر ہے۔

« بھوک زیادہ لگتی ہے۔

« ناک میں مواد نہیں ہے۔

« رات کو نہیں چیتے ہیں۔

نسخہ:

« سلفر 30 ایک خوراک۔

« Sl 13 bd سات روز تک۔

« مرہم اور وٹامن۔

ایک ہفتے بعد:

« سینے اور دائیں ہاتھ پر نیچے کی جانب نئی خارش ہو گئی ہے۔

« ہاتھ سے سونے کی چوڑی اتارنے کا مشورہ دیا گیا۔

« سلفر اثر کر رہی ہے۔

« SI 14 bd سات روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

« بہتری ہے لیکن خارش ابھی موجود ہے

« سلفر 3 تین خوراکیں ہر صبح پہلے چوتھے اور ساتویں دن لینا ہے۔

« ایڑھی کے شگاف تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور اب کوئی درد نہیں ہے۔

« مرہم اور وٹامن۔

ایک ہفتے بعد:

« مرض میں اضافہ ہوا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوا

« SI 14 bd سات روز

ایک ہفتے بعد:

« بہتر ہے۔

« SI پندرہ روز تک۔

پندرہ روز بعد:

- « مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔
 « 200 Petro ایک خوراک ہر ہفتے چار ہفتوں تک۔
 « علاج بند کر دیا گیا۔

اس کیس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کسی کیس میں مماثل دوا ہوتے ہوئے اسے استعمال نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کیلئے پہلے دوسری ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ کیونکہ مماثل دوا خطرناک حد تک مریض کی تکالیف میں اضافہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کیس کو علامات کی بنیاد پر کسی ایک علامت کو لیکر علاج شروع کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔

جیسا کہ کیس ایک گرم مزاج مریض کا ہے۔ اس میں وہ ادویات نہیں لیتا ہے جو ٹھنڈک سے بڑھتی ہیں۔ اس کیس کو Ant Crud سے شروع کیا گیا۔ اس نے اچھا کام کیا اور ٹیوبرکولس کے استعمال کے بعد خارش کو قابو کر لیا۔

مریض کی ضد میازی دور Passi Q نے اعصابی نظام پر اثر کیا جس سے نیند بہتر ہو گئی ہے لائیو پوڈیم جو ایک سلاٹ دوا ہے جو ہاضمے کی خرابی اور ساتھ میں ریاخ وغیرہ کو قابو کرتا ہے۔ اسکے بعد مریض کی مماثل دوا سلفر دی گئی۔ لیکن اس سے پہلے Echin Q کے قطرے دیئے گئے تاکہ خون کی صفائی ہو جائے۔ لیکن پھر بھی سلفر نے اپنا ضد اثر دکھایا اور نئی جگہ خارش پیدا کی اسی طرح سلفر 3 نے بھی اثر دکھایا لیکن ہومیو ادویہ میں یہ اثر ہوتا ہے چنانچہ سلفر نے اس مرض کو حفاً بخشی۔ یہ خاص بات ہے کہ سلفر کی بڑی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا تاکہ aggravation نہ ہو۔



پرانا درد سر اور نیند کی کمی

CHRONIC HEADACHE

WITH INSOMNIA

مرد، عمر 30 برس ہے

پرانا درد سر میں مبتلا ہیں شادی کو دو سال ہوئے ہیں۔ ان کو روزانہ صبح ساڑھے چار بجے درد سر ہوتا ہے۔ اور 8 بجے تک ختم ہو جاتا ہے۔

ان کو یہ مسئلہ 13 سال کی عمر سے ہے۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آرہے تھے۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ انھوں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کیا۔ ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔

سوالات کرنے پر معلوم ہوا کہ جب وہ 9 سے 10 ماہ کے تھے تو ان کو Dhatura کے بیج دیئے گئے تھے لیکن یہ بیج فضلے میں نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی اور تکلیف نہیں ہے۔

درمیانہ قد۔ سانولا رنگ، موٹاپے کی طرف مائل ذہنی دباؤ۔ لوگوں کا ساتھ پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہمدردی پسند نہیں کرتے۔ والد دل کے مریض۔ والدہ کو کوئی بیماری نہیں۔

میازم:

Psora acting

نسخہ:

یہ تمام علامات Cedron کی طرف جاتی ہیں Cedron 30 آٹھ خوراکیں
SI 6 bd رات روز تک۔

Passiflora Q 20 قطرے 1/2 کپ ٹھنڈے پانی میں رات سوتے وقت
روزانہ۔

ایک ہفتے بعد:

دو دن بعد دروازہ رک گیا۔

رات کچھ دیر سوئے۔

SI 20 bd دس روز

Pass Q 10 قطرے دوپہر کھانے کے ایک گھنٹے بعد اور 20 قطرے رات
سوتے وقت دس روز تک۔

دس روز بعد:

عمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔

علاج بند کر دیا گیا۔

Cedrn کا جادوئی اثر توجہ طلب ہے۔ جب سب کچھ ناکام ہو جائے تو
Passi اور Cedron مرض کو کم کرتے ہیں۔



محبت میں ناکامی

DISAPPOINTED LOVE

لڑکی، عمر 24 برس، یونیورسٹی کی طالبہ۔

مسلل صدمہ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کیونکہ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ اسے بتائے بغیر اس سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے چھ سات ماہ پہلے، اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ چاہتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔

اس سبب کی وجہ سے اس لڑکی کا دل ٹوٹ گیا اور اسے زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا حرج بھی ہو رہا تھا وہ کسی کو بھی اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ اور نہ وہ اپنی اس حالت کو قابو میں رکھ سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی۔

وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی اور خوب رونا چاہتی تھی تاکہ اس کا دل ہلکا ہو سکے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی آتسو بہا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اسکو اس حالت سے نجات دلاؤں۔ میں نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں اس طرح کے

واقعات ہو جاتے ہیں تمہیں یہ سب کچھ بھلانا ہوگا۔ اب وہ کچھ سنبھلی۔

نسخہ:

میں نے اُسے Ignatia 1M 3 خوراکیں دیں

« SI پندرہ روز تک۔

« Passi Q 20 قطرے 1/2 کپ گرم پانی میں سوتے وقت 15 دن تک۔

پندرہ دن بعد:

« اب وہ بہت بہتر لگ رہی تھی۔

« اب اس کی موجودہ ذہنی حالت اور نیند بہتر تھی لیکن کبھی کبھی خیالات واپس آتے

ہیں۔ Nat m 1M ایک خوراک۔

« SI پندرہ روز۔

پندرہ روز بعد:

اب وہ بہت بہتر ہے۔ پڑھائی پر توجہ دے رہی ہے۔ اور اپنی ڈاننگ کلاسز بھی شروع

کردی ہیں۔

علاج بند کر دیا گیا۔

یہ انکھیا اور Nat mur کا بہت اچھا کیس ہے۔



خواتین سے جھجک

MENTAL OBSESSION

مرد عمر 36 برس الیکٹرانک انجینئر ہیں

انھیں وہم ہو گیا تھا جو ان کی نارمل زندگی پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ انھوں نے بتایا کہ وہ عورتوں کے سلسلے میں بہت شرمیلے ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہم پچھلے ڈیڑھ سال سے شروع ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے انھیں اپنی بیوی کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی بیوی حاوی ہونے والی قسم کی عورت ہے۔ دس سال شادی کو ہو گئے ہیں۔ دو بیٹیاں، 7 اور 5 سال عمر کی ہیں۔

ان کا وہم ایک چھوٹے سے واقعے سے اچانک شروع ہوا کہ جب وہ ایک خاتون سے باتیں کر رہے تھے۔ اس خاتون نے اچانک خاص طور پر اپنی چھاتی کو ڈھکا اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن اس بات نے ان کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ اب وہ کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ کہیں اسکی نظر چھاتی پر نہ پڑ جائے اور آئندہ کبھی کسی بھی فنکشن میں خواتین کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔

انہیں معدے کا السر ہو چکا ہے جو اب ٹھیک ہے۔ اور اب رات کے وقت ناک بند ہو جاتی ہے۔ وہ بہت غصے والے اور جذباتی ہیں وہ ساتھ پسند کرتے ہیں لیکن ہمدردی پسند نہیں کرتے۔

اپنی بیوی کے جارحانہ رویے کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ جس کا نتیجہ موجودہ وہم ہے۔ ان کے اندر عورتوں کی طرف سے ایک کمزوری پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ ان کی بیوی کا رویہ ہے۔ اور یہی وہ اندرونی کمزوری ہے جو ان کے خیالات اور ان کی سوچوں کو تقویت دیتی ہے۔ انہیں اپنی الجھنوں کو ختم کرنا چاہیے۔

آج کل کی جدید سوسائٹی فیکر دیکھتی ہے۔ اور ایسے میں اگر کسی جوان مرد کی نظر کسی جوان لڑکی کے جسم پر پڑتی ہے تو یہ کوئی خراب بات نہیں ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے۔ اسلئے انہیں اس بات کو اتنا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔

میا زم:

سورا

نسخہ:

پہلے ہفتے

« سلفر 200 ایک خوراک

« SI 7 + لائیکو 30 3 خوراکیں + SI 3 bd سات روز

« Passiflora Q دس قطرے چوتھائی کپ گرم پانی میں رات سونے سے پہلے۔

ایک ہفتے بعد:

« بتایا کہ ان کی کمزوری میں کچھ کمی ہوئی ہے

« SI 14 bd سات روز

ایک ہفتے بعد:

« کمزوری تقریباً ختم ہو گئی ہے۔

« اور اب بزنس کے سلسلے میں چار ہفتے کے لیے امریکہ جارہے ہیں۔

« بیگم کے لیے Passiflora Q 9، 10 ذرا پس رات سوتے وقت۔

« IM Plat Met ایک خوراک پہلے اور سولہویں دن۔

« SI پندرہ دن تک۔

« سپیا 30 ایک خوراک + SI پندرہ دن پہلے اور سولہویں دن

« ایوینا سائیوا Q 5 قطرے 1/4 کپ گرم پانی میں صبح 6 بجے اور رات سوتے

وقت۔

پندرہ دن بعد:

« امریکا سے واپس آئے۔

« میاں بیوی کے علیحدہ علیحدہ انٹرویو کیے گئے۔

« امریکا میں بالکل ٹھیک تھے، کوئی کمزوری نہیں تھی لیکن جیسے ہی واپس پہنچے ان کی کمزوری

واپس آ گئی ہے۔ جب وہ امریکا گئے تھے تو کوئی کمزوری نہیں تھی لیکن جیسے ہی واپس

آئے کمزوری واپس آگئی۔

« بیوی کے بارے میں بتایا کہ ان کا رویہ کافی حد تک بدلا ہے۔ شوہر کی صحت کافی بہتر تھی۔ تین ہفتوں کے لیے دوائیں تجویز کی گئیں۔

پہلے ہفتے:

« 1M Arg Nil 3 خوراکیں

« SI 11 سات روز تک۔

دوسرے ہفتے:

« SI 11 سات روز تک۔

تیسرے ہفتے:

« لائیو پوڈیم 30 3 خوراکیں پہلے چوتھے اور ساتویں روز صبح کے وقت۔

« SI 11 bd سات روز تک۔

« بیگم امریکا USA میں بالکل ٹھیک تھی ان کی صحت میں واضح تبدیلی آئی ہے اور وزن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کو کوئی دوا تجویز نہیں کی گئی۔

تین ہفتے بعد:

« شوہر صاحب نے بتایا کہ وہ بہت بہتر ہیں اب دو سے تین خواتین کا سامنا کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اپنے اوپر زور دیتے ہیں کہ حواس کو قابو میں رکھیں اور انہیں اپنی اس کمزوری کو بھول جانا چاہیے۔

• SI or bd - سید کا گھر۔

• 1M ArgNit - ایک لڑکا SI or bd - سید کا گھر۔

• SI or bd - سید کا گھر۔

• 30 30 30 (30 30 30) - تین گنا گھٹ

• 30 30 30

کھل کر پھانسیا ہونے کے

ہیں کہیں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کہیں سے نہ نکلتے ہوئے ہوں۔
 کیا کیا کہیں کو سطر سے شروع کیا گیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر سے لے کر کہیں کے سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 سطر کے لیے راستہ نکال دیا گیا ہے۔

اسی طرح کہیں سے لے کر کہیں کے سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔

وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔

اسی طرح کہیں سے لے کر کہیں کے سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔
 وہ سطر کے سطر کے ساتھ ہی تھا۔

اور اس طرح روز بہ روز زندگی پر امن ہوتی گئی اگرچہ شوہر صاحب نے اسلئے بعد اپنی
دوسری بیماریوں کا علاج کروایا لیکن ان کا وہم دوبارہ واپس نہیں آیا۔



پرانا نزلہ اور کان کا انفیکشن

CHRONIC COLD WITH EAR INFECTION

15 ماہ کی ایک بچی:

بچی کو بار بار نزلہ ہو جاتا ہے۔ ناک بہہ رہی تھی اور بچی کے دائیں کان سے پانی جیسا پیلا مائع نکل رہا تھا۔ ناک سے نکلنے والے مائع کا رنگ بھی پیلا۔ اور پانی جیسا تھا لیکن کان سے نکلنے والا مائع زیادہ پیلا تھا۔ سینے میں کوئی جکڑن نہیں تھی۔ کبھی کبھی کھانسی تھی۔ بایاں کان بھی اثر انداز تھا لیکن کوئی مائع نہیں بہہ رہا تھا۔

ہسٹری:

ٹھنڈک لگ جاتی ہے۔

فیملی ہسٹری:

- « ماں، دس سال پہلے Tubercular patch
 « ماں کے باپ کو (پلیوریسی) پھیپھڑوں میں پانی تھا۔
 « TB فیملی۔

« دمہ اور Peptic Ulcer

ظاہری:

- « رنگت صاف، دانت نارمل۔
 « بایاں ناسل ہلکا سا سوجا ہوا
 « کوئی غدود نہیں ہے۔
 « زبان صاف، دانت ترتیب وار ہیں۔
 « سینے اور پھیپھڑوں میں کوئی تنگی Congeshin نہیں ہے۔

میازم

Tubercular

نسخہ:

- « Tuberculim 10 M ایک خوراک
 « SI s bd
 « پلسا ٹیلا 3x صبح اور شام سات بجے چار دن تک۔

چار دن بعد:

- « ماں نے بتایا کہ بچی کو تین پاخانے ہوئے جو نرم نہیں تھے
- « آج کوئی پاخانہ نہیں ہوا لیکن دوبارہ لٹی آئی ہے۔
- « دوا جاری رکھی گئی۔
- « ایلو پیٹھک دوا بند کر دی گئیں۔
- « دودھ بند رکھا گیا۔
- « Tubercular میازم میں دودھ برداشت نہیں ہوتا۔
- « مینھا دی۔ اُبے ہوئے چاول کا پیٹ اور اُبے ہوئے سیب استعمال کرائیں۔

چار دن بعد:

- « بچی کو پتلے پاخانے آئے جیسا کہ Tuberculanium 10 M کے بعد ہوتا
- چاہیے تھا۔ یہ ابتدائی ضد اثر ہے۔
- « اس کو روکنے کے لیے ایلو پیٹھک دواؤں کا سہارا لیا گیا۔
- « جبکہ بچی بہتر نظر آرہی تھی۔
- « بچی کی بھوک میں اضافہ ہوا ہے۔
- « ناک سے بہنے والا نزلہ بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔
- « اب کان میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔

نسخہ:

« فیرم فاس 3x صبح اور کلکیر یا فاس 3x شام ہر ایک کی دو گولیاں چائے کے چمچے میں گرم پانی کے ساتھ سات روز تک دیں۔

ایک ہفتے بعد:

« اب کوئی نزلہ نہیں ہے۔

« فیرم فاس اور کلکیر یا فاس استعمال کرتی رہیں

« ہائیڈرائس نمبر 10 گلوبول میں ملا کر دی گئی ایک ماہ تک استعمال کرنے کے لئے

کہا گیا۔ خوراک ایک گلوبول صبح گیارہ بجے روزانہ۔

« Cod Emulsion ایک چائے کا چمچ دوبار کھانے کے بعد ایک ماہ تک۔

ایک ماہ بعد:

« بچی اب ٹھیک ہے۔ مرض دوبارہ نہیں ہوا۔

« صحت میں بہتری آئی ہے۔

« وزن میں اضافہ ہوا ہے۔

« پچھلانا نسخہ بغیر Cod Emulsion کے۔

ایک ماہ بعد:

« صحت ٹھیک ہے۔

« لیکن ہلکا سا بہتا نزلہ ہے۔

« Tuberculinum 10 M ایک خوراک 2 گلوبولز۔

« Sl 13 bd سات روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

« بہتا نزلہ رک گیا۔ اس بار کوئی ضد اثر نہیں ہوا۔ فیرم فاس اور کلکیر یا فاس، اور ہائیڈرائس 15 دن کے لیے دی گئی اور کہا گیا کہ اگر نزلہ بہنا شروع ہو جائے تو بتائیں۔ اس کے بعد علاج بند کر دیا گیا۔

معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بچی اب بالکل تن درست ہے۔

اس کیس میں موروثی Tubercular کا 10 M Tuberculin سے علاج کیا گیا۔ جس نے بچی کے Constitution کو بدلا اور نارمل کیا۔ بائیو کیمک سالٹ ہائیڈرائس Q اور Cod Emulsion Q کو اضافی طور پر استعمال کیا گیا۔ تاکہ بچی میں طاقت پیدا ہو سکے۔



گلے کی شدید تکلیف

CHRONIC THROAT

INFECTION

اڑتالیس 48 سالہ خاتون

گلا خراب ہے جو رات میں زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جیسے مہینے سے اینٹی بائیوٹکس antibiotics لے رہی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گلا روز بروز خراب ہوتا جا رہا ہے۔ معائنہ پر معلوم ہوا کہ ان کی گلے کی حالت واقعی بہت خراب ہے۔ ٹھوس غذا نگلنے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تانبے جیسا ال رنگ ہے۔ پیپ (pus) بن سکتا ہے۔ میازم Psora Syphilitic بنیادی میازم سورا اور acting میازم سفلیٹک ہے ہمپر سلف ان کی مماثل دوا ہے۔

نسخہ:

” ہمپر سلف 6 تجویز کی گئی دن میں دو بار صبح شام سات روز تک۔

” آدھا کپ گرم پانی میں ہائیڈرائس پانچ قطرے رات اور صبح غرارے کریں۔

پندرہ دن تک وٹامن B کمپلیکس کا استعمال کریں۔

تین ہفتوں بعد:

« خاتون نے بتایا کہ وہ اب ٹھیک ہیں۔

« SI پندرہ روز تک۔

تین ہفتے بعد:

« صحت بہتر ہو رہی ہے۔

« علاج بند کر دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ دودھ، گوشت تلی ہوئی اشیاء 3 مہینے تک نہ کھائیں۔

اس کیس میں گلا بہت خراب تھا۔ اینٹی بائیوٹک کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ یہ گلے کا کینسر بن جاتا۔ موجودہ علاج نے اس کو صحت بخشی۔ اس کیس میں ہسپتال سلف نے مریضہ کی علامات اور میا زم کو کنٹرول کیا۔
علاج کے 16 سال بعد تک خاتون بالکل ٹھیک ہیں۔



خاندانی منصوبہ بندی کے مضر اثرات

AFTER EFFECTS OF MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY

شادی شدہ خاتون، عمر 30 برس، دو بچے ہیں۔

خاتون نے کچھ دن پہلے ہی اپنے تین ماہ کا حمل اسقاط کرایا ہے۔ اس کے بعد سے انھیں ہر روز سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ بخار کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا تھا۔ سر بھاری رہتا ہے اور بہت کمزوری اور سستی محسوس ہوتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ جسم میں درد پیاس زیادہ لگتی ہے۔ زبان سفید ہے۔ کوئی اخراج نہیں ہے۔ انھیں بخار ریکارڈ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

نسخہ:

دس ٹاکس 4-30 خوراکیں ہر صبح اور چار گھنٹے بعد Echnicea Q قطرے

چائے کے چمچے پانی میں چار دن تک دن میں چار مرتبہ۔

چار دن بعد:

حیض شروع ہوا اور بھاری مقدار میں ہوا۔ بخار جاری رہا۔
 30 I Pecac ایک خوراک ہر صبح شام چار بجے کے بعد Echinacea قطرے
 جیسے پہلے تھے تین دن تک۔

چار دن بعد:

بخار صبح میں 99° اور شام میں 101° کل صبح 10 بجے تک 98° تھا اور رات 100°۔
 زبان ابھی تک سفید ہے۔ الٹیاں رک گئیں حیض جو پہلے بہت گندا اور بودار تھا
 اب بو ختم ہو گئی ہے۔

پانچ دن کیلئے ان دواؤں کا استعمال کرایا گیا۔

« 7 am رس ٹاکس 30 ایک خوراک۔

« 9am Echinacea Q ایک قطرہ۔

« 11am فیرم ناس 6x تھوڑے سے گرم پانی میں 4 گولیاں۔

« 1pm Echinacea Q ایک قطرہ۔

« 3pm فیرم ناس 6x 4 گولیاں تھوڑے گرم پانی میں

« 5 pm Echinacea Q ایک قطرہ

« 9pm کالی فاس 6x چار گولیاں تھوڑے گرم پانی میں۔

« وٹامن B کمپلکس دن میں دو بار کھانے کے بعد۔

ایک ہفتے بعد:

« سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔

« عام کمزوری کے لیے فیرم ناس 6x کلکیر یا ناس 6x اور کالی ناس 6x 4 گولیاں ہر ایک تھوڑے گرم پانی میں روزانہ ناشتے lunch اور ڈنر کے بعد سات روز تک۔

سات روز بعد:

مکمل صحت یاب ہو گئی ہیں۔

ضبط ولادت (Birth Control) کے لیے آج کل جو اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر کنڈوم (condom) استعمال کرنے سے رحم میں زخم ہو سکتے ہیں۔
ہومیو پیتھی اس میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔

ضبط ولادت کے لیے استعمال ہونے والے آلات جیسے لوپ، آپریشن کے ذریعے جیسے ligation یا فلوپین ٹیوب کا vesection اور مردوں میں vas difference مادہ منویہ کی پیدائش کو روکنے والی دواؤں اور طبعی طور پر حمل کو روکنا (Medical Termination of Pregnancy=M.T.P) کے مضر اثرات کے کیسز آج کل بہت ہونے لگے ہیں۔ اس کیس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہومیو پیتھی کس طرح ان کیسوں میں کامیابی حاصل کرتی ہے اور زندگی کو صحت بخش ہے۔



سر کا مستقل درد

CONSTANT PAIN

IN VERTEX

خاتون عمر 67 سال، پانچ بچوں کی ماں:

مستقل درد سر جو دائیں جانب راس (vertex) نیچے کو ہوتا ہے۔ خاتون نے بتایا کہ درد گردن کے دائیں جانب اور بازو سے ہوتا ہوا دائیں ہاتھ تک آتا ہے۔ ڈھائی ماہ پہلے حادثاتی طور پر ایک بڑے سخت لکڑی کے ٹکڑے سے ٹکرا گئیں تھیں اسی دن رات کو درد شروع ہو گیا تھا۔ ان کا سر ٹکرانے کے فوری بعد کوئی درد نہیں ہوا تھا۔ ایک ماہ بعد ڈیڑھ گھنٹے تک ان کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ ان کا سن یاس (مینوپاز) 52 برس میں ہوا تھا۔

اس حادثے کے بعد ان کو مستقل درد ہو رہا ہے۔ ان کا Electro

Encephalogram نارمل ہے۔ دماغ کی اسکیننگ (Brain Scanning)

بھی کی گئی، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ حادثے کے وقت کی رپورٹ کے مطابق ان کی

چوٹ والی جگہ haematoma موجود ہے۔ زیادہ تر ایلو پیٹھک ادویہ آزمائی جا چکی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری علامات یہ ہیں۔

« بلند فشار خون Higrotone 1/2 ٹیبلٹ متبادل دن استعمال کرتی ہیں۔

« گلے کے دائیں جانب درد ہوتا ہے جو پانچ سال پہلے بھی تھا، اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔

« کبھی کبھی نبض رک جاتی ہے۔

« کوئی محنت کا کام کر لینے سے گہری سانسیں آتی ہیں۔

« جذباتی اور حساس ہیں۔ لوگوں کا ساتھ پسند کرتی ہیں لیکن، ہمدردی پسند نہیں کرتیں۔
پچھلی اور فیملی ہسٹری دستیاب نہیں ہے۔

معائنہ:

رنگ صاف، صحت مند، نبض سخت اور اچھلتی ہوئی۔ دل کی حرکت ست فشار خون

160/110

میازم:

سوراسائیکوس

تجویز:

« سب سے پہلے ان کے گلے کی تکلیف کا علاج کیا گیا۔ یلاڈونا IM 2 خوراکیں اور
مرک سال IM ایک خوراک متبادل صبح شام اور اگلی صبح

« SI 11 bd سات روز تک۔

« کافی پیمانہ ہے۔

ایک ہفتے بعد:

ان کے گلے کا درد ختم ہو گیا اور سر کے درد میں کمی ہوئی ہے۔ آر نیکا 2 IM
خوراکیں اور

« ہائپرکیم تیسرے اور ساتویں روز

« SI 10 bd سات روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

درد و دون سے بہتر تھا، لیکن دوبارہ بڑھ رہا ہے۔ آر نیکا 2 IM خوراکیں اور ہائپرکیم
IM ایک خوراک SI 11 bd سات روز۔

ایک ہفتے بعد:

« کبھی کبھی بہتر محسوس ہوتا ہے۔

« ہائپرکیم 10 M ایک خوراک۔

« SI 13 bd سات روز تک۔ Q Passiflora دس قطرے ایک چائے کا چمچ

گرم پانی میں رات سوتے وقت۔

ایک ہفتے بعد:

« درد ختم ہو گیا ہے۔

« SI 14 bd سات روز

« Q Passrflora جاری رکھیں۔

ایک ہفتے بعد:

صحت بہتر ہو رہی ہے۔

علاج روک دیا گیا ہے۔

اس کیس میں ہومیوپیتھی نے vertex میں ہونے والے مستقل درد کو کنٹرول کیا ہے

حادثے کی صورت میں۔ راس میں موجود عصب Nerve پر چوٹ آئی تھی۔

اسکے لیے صرف ہائپرکیم کو ہی استعمال کیا گیا جس کا اچھا نتیجہ نکلا۔ آرنیکا نے کسی بھی

ممکنہ چوٹ کے اثر کو زائل کیا ہے جس میں haematoma شامل ہے۔ ہائپرکیم

آرنیکا کی متبادل ہے جو عصب کے لئے بہترین دوا ہے۔



چہرے کی پرانی خارش

CHRONIC FACE ERUPTION

خاتون، عمر 72 برس، بیوہ، دو بچوں کی ماں۔

سات سال کی عمر سے ان کے چہرے پر خارش شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے چیچک chickenpox ہو چکی ہے۔ ان کا تمام چہرہ متاثر ہے خاص طور پر ناک کی نوک اور رخسار زیادہ متاثر ہیں۔ جو بہت سرخ ہو رہے ہیں۔ ناک کی نوک پر پھنسیاں بھی ہیں۔ چہرے کی جلد خشک ہے، اسلیئے وہ چہرے کو نم رکھنے کیلئے کریم استعمال کرتی ہیں۔ انھوں نے اپنی جلد کے بہت علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے اب جلد پر سوائے کریم کے کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتی ہیں۔ ان کی دوسری علامات درج ذیل ہیں۔

۱۔ آنکھیں:

دونوں آنکھوں کے مچلی اندرونی کناروں پر چھوٹی گھٹیا lump ہیں جو 68 برس کی عمر میں ہوئی تھیں۔ جن کا آپریشن کرایا گیا۔ 2 سال تک چہرہ صاف رہا لیکن پھر یہ شکایت ظاہر ہو گئی۔ دوبارہ آپریشن کروایا گیا ایک سال تک کیفیت ٹھیک

رہی لیکن تکلیف پھر شروع ہو گئی۔

« لے لے انگوٹھے میں ہلکا درد ہوتا ہے جو آتا ہے جاتا ہے۔

« رات کو دو بار پیشاب کے لئے اٹھتی ہیں۔

« ورم انفیکشن ہوا تھا جو ٹھیک ہو گیا ہے۔

« کتوں اور چھوٹے جانوروں سے ڈرتی ہیں۔

« میٹھا پسند ہے۔

« بائیں کان سے کم سنتی ہیں۔

ذہن:

« مسلسل فکر مند رہتی ہیں حساس ہیں۔ فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن اکیلا محسوس کرتی

ہیں۔ ہمدردی پسند نہیں کرتی ہیں۔

ظاہری اور معائنہ:

قد لمبا، صحت مند، دل اور نبض نارمل۔ فشار خون 130 / 80 زبان نرم، گلا ٹھیک ہے۔

ہسٹری:

ایک سال کی عمر میں خسرہ (Chicken pox) 6 سال کی عمر میں ٹھنڈک سے

حساس 35 سال کی عمر تک زلہ، کھانسی، ناسلو، براؤنکائش میں مبتلا رہی ہیں۔

خود کارویکسین سے براؤنکائش ختم ہو گیا۔

57 سال کی عمر میں Labar pneumonia ہوا۔ دو سال پہلے معدے میں

شدید درد ہوا تھا۔

فیملی ہسٹری:

والد ٹھنڈک سے حساس تھے۔ بڑھاپے میں جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے۔ والدہ کو erysipelas ہوا تھا۔

میازم

Psora Syph

Psora acting

نسخہ:

« 200 Variolinum ایک خوراک

« 1M , 200, 30 Staphysagaria اگلی صبح

« Sl پندرہ روز تک۔

« Becosule وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن سی کے ساتھ ایک کپسول روزانہ ناشتے کے

بعد۔

پندرہ روز بعد:

« دائیں آنکھ کی گلٹی lump ختم ہو گئی۔

« 200 Tuberculinum ایک خوراک

« 200 Psorinum + Slr ایک خوراک Slr bd سات روز تک۔

پندرہ دن بعد:

نسخہ:

- « 1M Tuberculinum ایک خوراک + Sl 13
 « 1M Psorinum ایک خوراک + Sl 13 دو ہفتوں کے لیے
 « وٹامن ساتھ میں۔

دو ہفتے بعد:

- « چہرہ اب بہتر لگ رہا ہے۔ اب پہلے کی طرح خشکی نہیں ہے۔
 « ناک کی نوک پر پھنسیا ختم ہو گئیں ہیں۔

نسخہ:

- « کلکیر یا فاس 12x 4 گولیاں دن میں دو مرتبہ چائے کے چمچے گرم پانی میں سات
 روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

- « کوئی بہتری نہیں ہوئی۔
 « چہرے کی جلد سرخ ہو رہی ہے۔ سرخی ناک کی نوک اور رخسار پر زیادہ ہے۔ کلاں نما
 عدسے Magnifying glass سے معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جلد کی سطح
 کے نیچے چھوٹی چھوٹی خارش دانی موجود ہیں جنہیں Scurry کہتے ہیں۔

سپیا 200,30 1M 3 دن صبح کے وقت۔

« SI پندرہ روز۔ وٹامن۔

دو ہفتے بعد:

مریضہ نے بتایا کہ چہرے پر کافی حد تک بہتری ہوئی ہے اور کبھی کبھی کریم لگاتی ہیں۔

نسخہ:

« سپیا 10 M ایک خوراک اگلی صبح

« 5 ہفتوں تک SI

« سپیا CM ایک خوراک تین ماہ بعد لینا ہے

« اور ہدایت کی کہ اپنی حالت کے بارے میں بتائیں۔

« اور اگر دوا کے لینے سے اس دوران تکلیف ہو تو اسے برداشت کریں۔ آپ کو اس میں

دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے اسے برداشت کر لیں۔

5 ہفتوں بعد:

« اطلاع ملی کہ اب کوئی زیادتی نہیں ہے۔

« چہرے کی جلد نارمل رنگ پر آگئی ہے۔

دو ہفتے بعد:

فرانس سے خبر دی کہ phial میں دی گئی سپیا CM لینے کے دو دن بعد agg

ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے برداشت کیا۔

وہ جیسے ہی فرانس سے واپس آئیں، کلینک پر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل نارمل ہو گیا تھا اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی چہرے کی خارش میں مبتلا تھیں۔

دائیں آنکھ میں node پھنسی کو Stphsigaria سے کنٹرول کیا گیا۔ دوسری تین دوائیں Psorinum Tuberculinm, Variolinum کو تمام ممکنہ رکاوٹیں دور کرنے کیلئے استعمال کیا گیا۔ جو انکی پچھلی ہسٹری میں موجود تھیں۔

اگرچہ Tuber اور Psorinum نے ان کے چہرے کو بہتر کرنے میں کم کردار ادا کیا ہے، لیکن ان ادویات نے علاج کیلئے راستہ بنایا ہے۔ ان کے چہرے پر اثر کرنے والی دوا Sepia ہے خارش Scurvy تھی تو Tuberculum اور Psorihun کے استعمال سے واضح ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے کی سرخی خاص طور پر ناک کی نوک کی علامت خاص علامت ہے جو کینٹ پیڑری میں (361, 365,) (page 366, 372) پر موجود ہے سپیا نے انکے چنی علامات کو بھی کو رکھا ہے۔ اس طرح سپیا نے ان کی بہت پرانی خارش سے نجات دلادی جو بچپن سے تھی۔

اس طرح زندگی بھر رہنے والی بیماری ہو میو پیٹھی سے کنٹرول ہو گئی۔ کیا یہ جادو نہیں ہے۔؟



چھاتیوں کی گٹھی

LUMPS IN BREAST

« خاتون عمر، 42 سال۔

« دونوں چھاتیوں میں lumps موجود ہیں۔ انھوں نے گائناکولوجسٹ اور ایک سرجن سے رابطہ کیا۔ مشورہ ملا کہ بائیوپسی Biopsy کروائی جائے اور اگر ضروری ہو تو آپریشن بھی کیا جائے۔ ایک اور ہومیوپیتھک معالج نے ایک گولی Chymoral تجویز کی۔

معائنے پر پتہ چلا کہ گٹھی چھاتی کے چوتھائی حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ گٹھی lump کو 4 سے 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تھوڑے سخت۔ دبانے پر درد اور چھوٹے اخروٹ کے سائز کے ہیں۔ ہموار نہیں ہیں۔ جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں۔ ان کے شوہر اس گٹھی کی وجہ سے بہت فکر مند تھے کہ کہیں کینسر نہ ہو۔ ان کو بتایا گیا کہ عام طور پر کینسر کیسز میں دونوں چھاتیاں ایک ہی وقت میں متاثر نہیں ہوتیں۔ نپل نارمل ہیں۔ یہ صرف fibro-adenomae ہو سکتا ہے جو اندرونی چوٹ کا سبب ہوتا ہے Chymoral کا استعمال جاری رکھا گیا۔

ایک ہفتے بعد:

adenomae میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ درد کچھ کم ہوا۔

نسخہ:

« 6x Bellis-Perennis bd پندرہ روز کے لئے۔ مشورہ دیا گیا کہ کسی ماہر سے رابطہ کریں ان کا Constitution Pro cancerous ہے انھیں ایک سال پہلے Carcinosis دیا جا چکا ہے۔ اب پندرہ روز کے لئے کشمیر جا رہی ہیں۔

پندرہ روز بعد:

اب بہتر لگ رہی تھیں۔ دائیں چھاتی میں گلٹی بہت چھوٹی رہ گئی ہے، اگرچہ دبانے پر کچھ درد محسوس ہوتا ہے۔ بائیں چھاتی میں گلٹی موجود ہے۔ یہ حرکت کر سکتی ہے اور دبانے اور چھونے پر کچھ محسوس نہیں ہوتا۔

نسخہ:

6x Bellis-Perennis bd سات روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

X-ray رپورٹ کے مطابق

Bilateral Mammograms. Nodularity is seen in upper outer quadrants. No evidence to suggest any malignant pathology.

« 6x Bellis pernnis bd ایک ہفتے تک۔

ایک ہفتے بعد:

دائیں طرف کی گٹھی ختم ہو گئی ہے جبکہ بائیں طرف کی گٹھی ابھی تک موجود ہے۔

نسخہ:

آج رات۔

« ایک خوراک 1M Carcinosis

« چار دن بعد Bellis P.rx پندرہ روز تک

« Becosule ایک کپسول روزانہ صبح ناشتے کے بعد۔

پندرہ دن بعد:

بائیں جانب کی گٹھی بھی غائب ہو گئی۔ دونوں چھاتیوں کو دوبانے پر کوئی تکلیف یا درد نہیں ہوا۔

علاج روک دیا گیا۔ صرف Becosule کا استعمال پندرہ روز تک کے لیے تجویز کیا

گیا۔ Bellis کے مسلسل استعمال نے مریضہ کو شفاء دی۔ 1M Carsinocin

معاون کے طور پر دی گئی کیونکہ بائیں جانب کے adenoma میں دوا کا اثر دیر سے

ہورہا تھا۔ ان کے Constitution کے مطابق دوا نے کام کیا اور بائیں چھاتی

میں adenoma کو شفاء دینے میں مدد کی ہے۔ Bellis کو گہری چوٹوں میں

استعمال کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔



بیضہ دانی کی رسولی

OVARIAN CYST

« خاتون، عمر 37 برس۔

بائیں بیضہ دانی ovary میں رسولی Cyst ہے۔ ایکس رے سے یہ ثابت ہو گیا کہ دائیں بیضہ دانی سخت ہے۔ حیض غیر مسلسل، ہمیشہ جلدی ہو جاتے ہیں۔ 5 دن تک رہتے ہیں۔ خون کے چمکدار سرخ اور چھوٹے لوتھڑے آتے ہیں۔ بھاری پن محسوس ہوتا ہے لیکن درد نہیں ہے۔ رحم پھیل گیا۔ آخری حیض دس دن قبل آیا تھا۔ انہیں رسولی کے بارے میں آٹھ ماہ قبل معلوم ہوا اور سرجری کا مشورہ دیا گیا لیکن انہوں نے اسے پسند نہیں کیا ٹیسٹ ٹیوب حمل ہو چکا ہے اور دائیں بیضہ دانی میں سلعہ رہ چکی ہے۔ دائیں بیضہ دانی 5 سال پہلے نکال دی گئی تھی اسکے بعد دو بچے ہوئے۔ بائیں جانب بھاری پن محسوس کرتی ہیں۔ اور جلدی تھک جاتی ہیں۔ بھول جاتی ہیں۔ جذباتی ہیں۔ دوسروں کی ہمدرد ہیں لیکن خود ہمدردی پسند نہیں کرتیں۔ باتونی ہیں۔ والد شوگر کے مریض، والدہ اور تانی دے کا شکار رہ چکی ہیں۔

ظاہری:

رنگ صاف، قد لمبا، صحت مند، نارمل۔

معائنہ:

دل اور نبض نارمل، نبض 80، بلڈ پریشر 120/80 زبان صاف، بائیں بیضہ دانی میں دبائے پر درد نہیں ہوتا۔

میازم:

Syco Syphilitic

Psora in Background

نسخہ:

« لائیکوپوڈیم 1M ایک خوراک۔

« Fraxinus Americana Q 10 قطرے نیم گرم پانی میں رات سوتے وقت

ایک ہفتے بعد:

چھاتیاں پر درد خاص طور پر دائیں چھاتی۔

« برائیوینا 30 3 خوراکیں۔

« Sl 11 bd سات روز تک

« Fraxinus Americana Q جاری۔

ایک ہفتے بعد:

- « چھاتی میں درد ختم ہو گیا۔ حیض جلدی شروع ہو گئے۔
- « پہلے تین دن اخراج بھاری تھا۔
- « تو جا 30, 200, 1M رات سوتے وقت تین دن۔
- « SI پندرہ روز تک۔
- « چوتھی رات سے Q F. Americana جاری کر دیں۔
- « دواؤں کا استعمال حیض کے بعد کریں۔

پندرہ روز بعد:

- بائیں بیضہ دانی کا بھاری پن ختم ہو گیا ہے۔
- « SI 14 bd
- « پہلے کی طرح Q F. Americana
- « چھ روز بعد حیض متوقع ہے۔

ایک ہفتے بعد:

- « بہتر محسوس کر رہی ہیں۔
- « حیض اب ایکسویں اور چوبیسویں دن کے درمیان آ رہا ہے۔
- « 4-5 دن ہوتا ہے۔
- « چند ماہ قبل گائنا کولو جسٹ نے معائنہ کیا۔ اور کہا کہ اب کوئی سلعہ محسوس نہیں ہو رہا

« ہے اس باران کو حیض رک رک کر آ رہا تھا۔ بہاؤ نہیں تھا۔
 « گائناکولوجسٹ سے معائنہ کرانے پر معلوم ہوا کہ سلعہ دوبارہ بن گئی ہے یہ سخت ہے
 اور ایک انچ تک ہے۔
 5 Q Viburnum O pulus 5 قطرے نیم گرم پانی میں دن میں دوبار
 جب تک بہاؤ نارمل نہ ہو جائے۔ اور حیض ختم نہ ہو جائے۔ سلفر 200 ایک
 خوراک۔

« SI 13 bd سات روز تک۔

سات روز بعد:

- « موجودہ میازم سفلیک ہے
 « کینٹ ریپرٹری کے مطابق تجزیہ یہ ہے
 ۱۔ بائیں بیضہ دانی میں سلعہ Lachesis صفحہ 746
 ۲۔ سخت Lachesis (indurachian) صفحہ 367
 ۳۔ رک رک حیض Lachesis صفحہ 726
 ۴۔ خارش Lachesis Scanty صفحہ 738
 ۵۔ باتونی Lachesis صفحہ 63
 ۶۔ تیزی سے بولتی ہیں Lachesis صفحہ 87
 Lachesis ان کی مماثل دوا ہے اور میازم بھی کور کرتی ہے۔
 Lachesis 1M تین خوراکیں ہر ایک میں دو گلوبولز ہر تین گھنٹے پر صرف پہلے
 دن۔

« SI پندرہ روز تک۔

پندرہ روز بعد:

حیض آیا ہے یعنی 27 ویں دن جو نارمل ہے۔ اب بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں۔

« SI پندرہ روز تک۔

پندرہ دن بعد:

حیض 10 تاریخ کو متوقع تھا لیکن نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی پریشانی بتائی۔

« 200 Nat mur

« Sls

« 200 Kali-C

« bd Sls 6 روز تک

ایک ہفتے بعد:

« حیض نہیں ہے۔

« گائنا کولو جسٹ سے رابطے کا مشورہ دیا گیا۔

« کوئی دوا نہیں دی گئی۔

ایک ہفتے بعد:

گائنا کولو جسٹ نے تصدیق کر دی کہ حمل ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ روزانہ تھوڑا سا

چمکدار خون کا اخراج ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے۔ جب جنین رحم کی

آدھے حصے میں ہو۔ Placenta Praeva کا کیس متوقع ہے۔ اس مرحلے پر
ہومیوپیتھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ہے۔

ایک ہفتے بعد:

انہوں نے بتایا کہ بچے کی جنس معلوم ہو گئی ہے وہ لڑکا ہے۔ الزا ساونڈ سے معائنے کے
بعد گائنا کولو جسٹ نے یہ قبول کیا کہ یہ Placenta Praeva کا کیس ہے لیکن
وہ اپنی دوائیں مزید استعمال کروانا چاہتی تھی جو بچے اور ماں دونوں کیلئے خطرہ بن سکتی
ہیں۔ مریضہ میں خون کی کمی ہو گئی ہے اور وہ بہت مشکل سے حرکت کر پارہی ہے۔ ان
کو Placenta Praevic کے خطرات سے آگاہ کیا گیا اور اگر مزید ادویہ کا
استعمال کیا گیا تو یہ بچے اور ماں دونوں کیلئے خطرہ ہے یہاں تک کہ اسقاط حمل بھی
خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسلئے گائنا کولو جسٹ کو موقع کی نزاکت کا احساس دلایا
گیا۔

تین ماہ بعد معلوم ہوا کہ دو ماہ قبل Suchon کے طریقہ سے اسقاط حمل کر دیا گیا
ہے۔ وہ کافی عرصے تک بستر پر رہیں اب وہ ٹھیک ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ مریضہ نے
حمل کے دوران خطرناک حالات سے نجات پالی۔

اس کیس میں بانئیں بیضہ دانی کی سلعہ Cyst کا علاج شروع کیا گیا تھا اور آخر میں
حمل Placenta Praevia اور اسقاط حمل پر ختم ہوا۔

کیس کے شروع میں لائیکوپوڈیم استعمال کی گئی تھی۔ Faxinus Americana
رحم کو صحیح شکل میں لانے کے لئے تجویز کی گئی تھی۔ شروع میں سائیکوٹک میازم زیادہ
ظاہر تھا اور تھو جانے اچھا اثر کیا۔

یہ صرف سلفر کے بعد ہی ہوا کہ سفلیک میازم سامنے آیا اور اس طرح Lachesis ان کی مماثل دوا بن سکی۔ یہ دوا ان کیلئے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس سے ان کی صحت واپس آگئی اور حمل بھی ٹھیک چلنے لگا۔ بائیں جانب کی بیضہ دانی کی سلعہ حمل کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی تھی۔

درحقیقت یہ کیس Placenta Praevia کا ہے۔ Placenta Praevia ہمیشہ ماں اور بچے دونوں کے لئے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ خون آنول Placenta کے الگ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ lower Uterine segment ، placenta میں جڑا ہوتا ہے۔ اندام نہانی میں چمکدار خون کے ساتھ درد نہیں تھا۔ خون بار بار آرہا تھا۔ شکم میں کوئی درد نہیں تھا۔

مریضہ آہستہ آہستہ خون کی کمی کا شکار ہو رہی تھی اس لیے بغیر وقت ضائع کیے اسقاط حمل بہت ضروری تھا۔ جب کہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے placenta Praevia ثابت ہو گیا تھا۔ Placenta Proevia کے کیسز دیر سے ہونے والے حمل میں ہوتے ہیں۔



معدے میں خون کا رساؤ

STOMACH HAEMORRHAGE

63 سالہ خاتون، پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔

ایک مشہور ہسپتال میں نرسنگ کی سہولت کے ساتھ داخل ہیں۔ وہاں انہیں مسلسل خون کا اخراج ہو رہا تھا دو دن پہلے رات ساڑھے بارہ بجے سے خون کا بہنا شروع ہوا۔ لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا گیا تھا کہ یہ خون رحم سے بہہ رہا ہے یا معدے سے بہہ رہا ہے مریضہ کو مسلسل خون کی بوتلیں چڑھائی جا رہی تھیں۔ ابھی تک خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ کیس بہت سنجیدہ ہے۔ اور اس کے لئے فوری فیصلہ کرنا ہے۔

Virruca Minor کو منتخب کیا گیا کیونکہ خون بہت بہہ رہا تھا۔ جسم میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے مریض مرنے والا ہے۔ معدہ چھوٹے سے بہت حساس ہے۔ یہ رحم سے ہونے والے خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کیلئے مفید دوا ہے۔ لیکن اس کا کنٹرول عضلاتی خون، خون کی نالیوں کے بہاؤ پر بھی ہوتا ہے یہ 3 پونینسی میں 14 خوراکیں۔ ہر گھنٹے پر دی گئیں۔

بہتر ہے۔ رات کو کوئی اخراج نہیں ہوا

« خون کا اخراج صبح دوبارہ ہوا۔

« اخراج گہرا لال ہے اور مریض مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔

« چائنا، 6 سات خوراکیں اور 6 Hamamelis سات خوراکیں متبادل ہر دو گھنٹے

پر۔ Sanotogen ایک ملک پراڈکٹ ہے جس میں Vit B Complex،

فولک ایسڈ اور glycerophosphate شامل ہیں جو جسم میں براہ راست جذب

ہو جاتے ہیں جس سے جسم کو طاقت ملتی ہے ایک چائے کے چمچے کے برابر دن میں

چار مرتبہ۔

ایک دن بعد:

« خون کے بہاؤ میں کمی ہے اور اخراج مسلسل کم ہو رہا ہے مریض بہتر محسوس کر رہی

ہیں۔ اب خون کا رنگ brownish black ہو گیا ہے۔ درد نہیں ہے۔

« 6 Hamamelis سات خوراکیں۔

« 6 China چار خوراکیں۔

« 6 Bryonia تین خوراکیں۔

« ایک بار ہیماتیس چائنا اور

« ایک بار ہیماتیس برائیونیہ ہر 2 گھنٹے پر آخر میں China کے ساتھ لیتا ہے۔

دو دن بعد:

« اخراج کی رفتار اب بہت حد تک کنٹرول ہو گئی ہے۔

« خون کی بوتل اب نہیں چڑھائی جارہی ہے لیکن drip چڑھائی جارہی ہے۔

« کوئی معائنہ نہیں ہوا ہے۔

« کل رات ایک بار اخراج ہوا تھا۔

« اور دوپہر دیر ھ بجے تک دو مزید اخراج ہو گئے تھے لیکن اخراج کی مقدار بہت کم تھی۔ اب رنگ چمکدار سرخ ہے۔ ڈاکٹر نے مندرجہ ذیل دوائیں تجویز کیں۔

Chloromycetin-Bactrim, Inj. Lasix, Inj. Calmpose. ہدایت

کی گئی کہ Chloromycetin اور Bactrim نہ لیں کیونکہ یہ خون پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور مریضہ کی موجودہ صورت حال میں یہ غیر ضروری ہیں۔ لیکن Inj. Calmpose اور Inj. Lasix پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسا کہ خونی اخراج اب تک نہیں رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔

یاد رہے کہ مریضہ پیدائشی دل کی مریضہ ہیں اور ساتھ میں دل کی دوائیں بھی استعمال کرتی ہیں جن میں Dispris کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہیں۔ اس طرح یہ خیال ہوتا ہے کہ ان ادویات کے استعمال کی وجہ سے معدے کی اندرونی سطح سے خون کا اخراج ہو رہا ہے۔ جیسا کہ بہنے والا خون چمکدار سرخ تھا، اس لیے Arnica اور I Pecac کو منتخب کیا گیا۔

« آرنیکا anti-asprin اور anti-haemorrhage ہے اور معدے کی اندرونی

سطح پر خاص اثر کرتی ہے آرنیکا کی 30 پونسی I Pecac کی 200 پونسی ہر ایک کی پانچ خوراکیں متبادل ہر دو گھنٹے پر۔

« Sanatage کی خوراک ایک چمچے سے دو چمچے کر دیں۔

دودن بعد:

اب کوئی haemorrhage نہیں ہے۔ کیا حیران کن نتیجہ ہے! اب ہر دوا کی چار خوراکیں ہر چار گھنٹے پر۔ اسکے علاوہ Q Echinacea (اندرونی) کیلنڈولا Q بطور 1:2، پانچ قطرے 1/2 کپ پانی میں ہر چار گھنٹے پر لیکن دن میں صرف 3 مرتبہ۔

5ml کا مکسچر دیا گیا تا کہ معدے میں زخموں کو بھر سکے۔ مزید 3x Ferrphos 4 گولیاں ایک خوراک میں دن میں 3 مرتبہ تا کہ مریضہ کی خون کی کمی کو دور کیا جاسکے۔ ہدایت کی گئی کہ مریضہ کو ہسپتال سے چھٹی دلا دی جائے۔

اگلے روز:

- « کوئی haemorrhage نہیں ہے۔
- « ہسپتال سے چھٹی کر دی گئی تھی۔
- « ہاسپٹل کی ڈسچارج شیٹ دیکھی تو وہاں تشخیص کا کوئی نشان نہ تھا۔ معائنہ کا تمام ڈیٹا نارمل تھا۔ جو ادویہ تجویز کی گئی تھی ان کا ذکر دودن پہلے اوپر کر دیا گیا ہے۔
- « 1 Pacac 200 4 خوراکیں اور آرنیکا 30 3 خوراکیں ہر چار گھنٹے پر۔
- « Echeae - Calendula mixture استعمال کریں۔

اگلے روز:

- « haemorrhage نہیں ہے۔

« کل 1/2 گولی Lasix دی گئی۔

« آج صبح ہلکا سا بخار 99° تھا۔

« بار بار تھوڑی مقدار میں پیشاب آ رہا ہے کبھی کبھی غیر ارادی بھی آتا ہے۔

« کھانے کے بعد pot klov دو کھانے کے چمچے پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

« کاسٹیکم 30-3 خوراکیں ایک آج شام اور اگلے روز دوبارہ لیں۔

« مریضہ کی ہسٹری میں تین سال پہلے دائیں طرف کا فالج ہو چکا ہے۔

دو دن بعد:

دوسرے دن درجہ حرارت نارمل ہو گیا۔ اور اب مریضہ haemorrhage سے

مسلل نجات پا رہی تھی۔

« اب صبح میں وہ اجابت کر رہی تھیں۔ لیکن اس کا رنگ کالا تھا اور جب اس پر پانی ڈالا

جاتا تو یہ کالا سرخ بن جاتا۔

« فیملی فزیشن نے دو تین دوائیں تجویز کی ہیں۔ جن میں Chlorostrep بھی

شامل رہے۔ اجابت آنا ایک اچھی بات ہے۔ بڑی آنت حرکت میں آ رہی تھی۔

اور اجابت میں جو کچھ آ رہا تھا وہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ اب بڑی آنت میں موجود

Hamorrhage باہر نکل رہے تھے جنہی پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

« Hamamelis 6 سات خوراکیں ہر گھنٹے پر اجابت کی رنگت کو بہتر کرنے کے لئے

ایلو پیتھک ادویہ کا استعمال نہ کریں۔

تین دن بعد:

مریضہ اب ہر صبح پیلے رنگ کی اجابت کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔
مریضہ کا ہموگلوبن 10.5 ہے لیکن ان کے بھائی سے معلوم ہوا کہ وہ سانس لینے
میں دشواری محسوس کر رہی ہیں۔
جوانھوں نے پہلے کبھی نہیں بتایا تھا۔
China 200 تجویز کی گئی ہدایت دی گئی کہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے مشورہ لے لیں۔

تین دن بعد:

اطلاع ملی کہ وہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے نرسنگ ہوم سے چھٹی لے گئی ہیں۔

تین دن بعد:

مریضہ کی سانس بہتر ہے۔

معدے میں موجود Haemorrhage 7 کی وجہ سے ایک مریض کی جان خطرے
میں پڑی ہوئی تھی مریض کو ایک بہت اچھے ہسپتال میں داخل کیا گیا اور ساتھ میں
نرسنگ سروس بھی دی گئی۔ مریض کی حالت کے مطابق اسکے فوری طبی امداد کی
ضرورت تھی۔ بجائے اسکے کہ اسے خون کی بوتلیں یا drip چڑھائی جاتی۔ جس سے
مریض زندہ نہیں رہ سکتا تھا لیکن یہ صرف ہومیو پیتھی ہی ہے جس نے اس
haemorrhage کو کنٹرول کیا۔ شروع میں استعمال کی جانے والی ادویات نے
haemorrhage کو کنٹرول تو کیا لیکن بند نہ کر سکیں۔ haemorrhage کی اصل

وجہ کو تلاش کرنا تھا اور وہ تھی disprin کا لمبی مدت تک مسلسل استعمال جس نے
معدے کی اندرونی سطح کو تباہ کر دیا آرنیکا اور اپی کاک نے کیس کو شفاء دی۔



اعصابی نظام کی خرابی اور نزلہ وز کام

CEREBRO-SPINAL DISCORD

WITH CHRONIC COLD

لڑکا، عمر 16 سال:

(maxillary) Sinusits

اعصابی نظام کی خرابی اور پُرانا نزلہ وز کام:

« بائیں طرف زیادہ متاثر ہوا ہے۔

آنکھ:

« آنکھ بائیں اوپری lid میں تاؤ ہے بائیں آنکھ دائیں سے چھوٹی نظر آتی ہے

ناک:

« ناک کافی عرصے سے بند ہے۔

- « روزانہ Otrivia استعمال کرتا ہے۔
- « سردی آتے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے
- « اکتوبر سے نومبر اور مارچ تک جاری رہتا ہے۔
- « دو سال کی عمر میں گرنے کی وجہ سے ناک کی جڑ عاجز پر (Septum) کی بانیں جانب چوٹ آئی تھی۔ اسی وجہ سے عاجز تھوڑی سی دائیں جانب کو مڑ گئی ہے جسکی وجہ سے دائیں ناک بند ہو جاتی ہے۔
- « 14 سال کی عمر میں بڑھی ہوئی Septum کو آپریشن سے ٹھیک کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ناک بند ہوتی ہے۔
- « نزلہ اور کھانسی سے حساس ہے۔
- « اکثر سب سے پہلے گلا خراب ہوتا ہے اسکے بعد نزلہ کھانسی بخار اور ٹانسو بھی ہوتے ہیں۔ دائیں Scapula کے اوپر بازو پر ایک نرم سادھیا ہے۔ یہ دھبہ دائیں جانب سر گھمانے درد کرتا ہے اور بائیں جانب سر گھما سے درد نہیں ہوتا ہے۔

کان:

- سردیوں میں رات نو بجے کان سرخ اور گرم ہو جاتے ہیں
- « goitre ہو چکا ہے۔
- « بائیں آنکھ میں پھڑک ہوتی ہے۔
- « جلدی تھک جاتا ہے۔ کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکتا۔

ذہن:

« حساس، جذباتی، روتا ہے۔ ساتھ پسند کرتا ہے۔ اور ہمدردی پسند کرتا ہے۔

فیملی ہسٹری:

والد نزلہ زکام، کھانسی سے حساس ہیں۔

دسمبر جنوری میں تکلیف ہوتی ہے۔ معدے کی تکلیف، آنتوں میں تکلیف اور دل کی تکالیف ہیں۔

ظاہری:

سانو لارنگ قد لمبا، دبلا لیکن ہڈیاں اچھی طرح بنی ہوئی ہیں۔ لمبا چہرہ، سینے اور پیچھے صاف ہیں۔ بلڈ پریشر 110/70 نبض 68 زبان پر ہلکی سی تہہ ہے۔

میا زم:

سورا، سفلیٹک۔

نسخہ:

صبح کے وقت سلفر 200 اور شام کو Nux vom 30 اور اگلے دن لائیکوپوڈیم 3,30 خوراکیں۔

Nux vom 3 خوراکیں صبح و شام 3 دن تک۔

چار دن بعد:

- « بہتری ہوئی ہے Otrivin کی ضرورت نہیں پڑی۔
 « بہتر نظر آ رہا ہے اور سکون سے ہے۔
 « بائیں آنکھ بالکل نارمل ہے۔
 « SI 6 + سلیخیا 30 3 خوراکیں SI 5 bd + سات روز

ایک ہفتے بعد:

- « بدستور بہتری ہو رہی ہے۔
 « نیویرکولینم 200
 « SI 13 bd سات روز۔

ایک ہفتے بعد:

- « ناک کا بند ہونا اب صرف بائیں ناک تک ہے۔
 « Spigila 6 3 خوراکیں۔
 « SI 11 bd سات روز تک۔

ایک ہفتے بعد:

- « بہتری ہے لیکن اب (Viral Fever) وائرسی بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
 « بیلاڈونا 30 سات خوراکیں۔ + آرسینک 30 سات خوراکیں روزانہ
 خوراکیں۔ 4+3+3+2+2

ایک ہفتے بعد:

« تیسرے دن بخار ختم ہو گیا۔

« بائیں ناک بند ہے۔

« یہاں پر ایک خدشہ یہ ہے کہ ناک میں اوپر کی جانب کوئی ایسی چیز ہے جو راستہ بند

کر رہی ہے۔ شاید یہ Polypus یا Polypi اور کوئی اور بلا کنگ ایجنٹ ہو سکتا ہے۔

E.N.T اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنے کی ہدایت کی گئی اور ساتھ میں لائیکو پوڈیم 30

3 خوراکیں 30 Nux Von دو خوراکیں Sl s bd پانچ روز تک۔

پانچ روز بعد:

اگرچہ ناک کی رکاوٹ میں کمی ہے لیکن ابھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے E.N.T

اسپیشلسٹ کے مطابق ناک میں کوئی polypus یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔

Sl7 + 1M Tuberculinum + کلکیر یا کارپ 30 3 خوراکیں

+ Sl4 15 دن ایک دفعہ صبح کے وقت۔

دو ہفتوں کے بعد:

« اب کوئی نزلہ زکام نہیں ہے

« بائیں ناک بہت تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے۔ نیو کولینم 1M 3 خوراکیں دو گلیوبیڈز ہر

تین گھنٹے بعد پہلے دن +

« Sl 12 سات روز۔

« Thuja لوٹن 1:6 (D. water) رات اور صبح کو ناک سے کھینچتا ہے۔

ایک ہفتے بعد:

بائیں ناک کی کاوٹ میں بڑی حد تک کمی ہے۔ اب وہ آسانی سے سانس لے سکتا ہے
کبھی کبھی ناک بند محسوس ہوتی ہے۔

تھو جا لوٹن ایک بار پھر استعمال کرنا ہے مناسب مقدار پندرہ روز کیلئے دیا گیا۔

تین ماہ بعد:

اب بائیں ناک بند نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی دائیں ناک بند ہوتی ہے جب کبھی سردی
ہوتی ہے انھوں نے کوئی اور دوا نہیں لی بلکہ نزلہ زکام خود بخود ایک دو دن میں ٹھیک
ہو گیا لیکن اب کچھ نئی علامات ابھر آئی ہیں وہ یہ ہیں۔

« ایک ماہ قبل اچانک بائیں آنکھ کی نظر دھندلا گئی تھی۔ کچھ دن بعد سماعت بھی کمزور
ہونے لگی۔

اور تین چار دن بعد جسم کے بائیں جانب حسایت میں کمی محسوس ہونے لگیں لیکن اب
بائیں جانب کی حسایت ٹھیک ہو گئی ہے اور نظر ابھی تک دھندلائی ہے ساتھ میں کان
کی سماعت بھی کمزور ہو گئی۔

« حسایت کی کمی اب بائیں جانب سے دائیں جانب منتقل ہو گئی ہے اگرچہ صرف
دائیں ہاتھ تک محدود ہے۔ انگلیاں بھی شامل ہیں۔ اسکی انگلیوں میں حسایت کی کمی کی
وجہ سے لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ پہلے لکھے
ہوئے الفاظ سے مختلف ہیں اسی طرح ہاتھ سے کھانا کھانے میں بھی دقت ہو رہی

ہے۔

ماہرین کی رائے کے مطابق کچھ کا خیال تھا کہ یہ عضلات کی کمزور ہونے کی نشانی ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ Thalamus کے عمل میں خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر Thalamus خراب ہے تو جسم کے تمام حصوں کی حرکت متاثر ہوتی ہے جبکہ یہاں صرف ہاتھ متاثر ہوا ہے۔

اسکے علاوہ دوسری وجہ Circulation System اعصابی نظام خاص طور پر Spinal cord کے ذریعے پیغام Cerebral cortex تک پہنچانے میں فرق ساتھ میں Cervical, branchial اور دوسرے plexuses شامل ہو سکتے ہیں۔

ہاتھ اور ٹانگوں کی کمزوری اور دائیں گردن کے پاس spot میں دائیں طرف سر گھمانے پر درد ہونا اس بات کو تقویت دیتا ہے جبکہ مریض بہت ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے اور ساتھ میں نظر کمزور ہے۔

نسخہ:

« ایکوٹائٹ 200 3 خوراکیں۔

« +Sl₂ +پلساٹیل 200 +bd Sl₂ پانچ روز تک۔

پانچ روز بعد:

« اب اسے لکھنے اور دیکھنے میں بہتری ہوئی ہے۔ 4 Five phos 6x گولیاں

صبح شام ایک کپ گرم پانی میں حل کر کے سات دن تک استعمال کریں۔

ایک ہفتے بعد:

- « نظر میں دھندلا پن مزید دور ہو گیا ہے۔
- « لکھنے میں مزید بہتری نہیں ہوئی ہے۔
- « پلسا ٹیلا 1M ایک خوراک اور bd Sl 13 سات روز تک۔
- « مریض کی تکالیف ایک طرف ہیں اور انکی ذہنی علامات اس انتخاب کی بنیادی وجہ ہیں۔ جبکہ بائیں آنکھ میں نظر کی کمزوری ایک زائد factor ہے۔

پندرہ دن بعد:

دونوں ہاتھوں کی لکھائی اور دائیں آنکھ کی نظر نارمل ہے 6x Five phase پہلے کی طرح پندرہ دن تک۔

سات ماہ بعد ماں سے معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصہ ٹھیک رہا۔ لیکن پڑھائی کے بوجھ اور امتحانات کی پریشانی کی وجہ سے اس کی بائیں آنکھ کی نظر میں کمی ہو رہی ہے اور دائیں ہاتھ میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور ساتھ میں دائیں ٹانگ میں بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔

اس کو عادت ہے کہ وہ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے جسکی وجہ سے اسکے Circulation میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کرسی اور میز استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔

نسخہ:

آرنیکا 200 ایک خوراک + ایکونائٹ 200 3 خوراکیں + Sl₂ + Puls 200

3 خوراکیں + Sl9 + لائیو 200 Sl7 bd 12 روز تک۔

اس کے ساتھ مناسب مقدار 6x Fivephose نیم گرم پانی میں امتحان سے پہلے اور بعد میں استعمال کریں۔

چار ہفتے بعد:

امتحانات ختم ہو گئے بچے کی نظر اور لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ لیکن اب اسے دائیں جانب کے جسم میں کمزوری اور چلنے کے دوران ناہمواری Unsteady محسوس ہو رہی ہے۔

نسخہ:

سلفر 200 ایک خوراک Sl5 کلکیر یا کارب 200

لائیو 200 Sl5 + bd Sl + دو ہفتے تک۔

دو ہفتے بعد:

« کچھ بہتر ہے لیکن چلنے کے دوران لڑکھڑانے لگتا ہے اور جب اگلیوں سے کوئی کام رہا ہو تو اچھا محسوس نہیں کرتا ہے اب Cerebro Spinal axis کی کمزوری سامنے آرہی ہے۔

« کاسٹیکم 30 3 خوراکیں۔

« bd Sl 11 سات روز تک۔

سات روز بعد

« چلنے کے دوران لڑکھڑانے میں کمی ہوئی ہے۔

« اب انگلیوں میں بھی بے چینی نہیں ہے۔

« 14 bd Sl سات روز۔

ایک ہفتے بعد:

« کوئی فرق نہیں پڑا

« کاسٹیکم 200 ایک خوراک + Sl اور 6x five phase پندرہ دن تک۔

دو ہفتے بعد:

اس کی تمام علامات ختم ہو گئی ہیں۔

« علاج بند کر دیا گیا۔

دو ماہ بعد:

ٹیلی فون پر اس کی والدہ سے معلوم ہوا کہ وہ اب ٹھیک ہے اور کالج پڑھنے جاتا ہے میں اس کیس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا جس میں مریض کی علامتوں کی بنیاد پر موجودہ ضروریات کو پورا کرے۔ یہ کیس 10 ماہ تک چلا۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مریض کی ناک کی تکلیف دور کی گئی جس میں بائیں جانب کی ناک کی رکاوٹ کو Tuberculinum کلکیر یا کارب، Thuja اور Tuecium لوشن جس نے ناک کے Polypus کو ختم کیا۔

دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب مریض سفر سے واپس آیا۔
 Cerebro spinal axis میں کمزوری آگئی کا سٹیمک نے اس میں بہت اچھا اثر
 دکھایا۔ اس نے تین خاص علامات کو کور کیا تھا۔
 دماغ اور اعصابی نظام کے عمل میں ربط پیدا کیا۔
 چلنے کے دوران لڑکھڑانے کو بھی کافی حد تک ختم کیا ہے انگلیوں سے کوئی کام لینے سے
 تکلیف میں اضافے کو قابو کیا۔
 مریض اس دوا سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے۔



ہومیو ویب ڈاٹ نیٹ

پاکستان کی پہلی اور سب سے بڑی ہومیو ویب سائٹ
1999ء سے مسلسل خدمات جاری ہیں

www.homeoweb.net

ڈاکٹرز ڈائریکٹری، کالج ڈائریکٹری، فری ای کلینک،

فری ایمیل سروس، فری ایمیل گروپ سروس،

جدید ہومیو سافٹ ویئر، کارا اور راڈار دستیاب ہیں۔

ہومیو پیٹھی اور کمپیوٹر پر لکھی جانے والی پہلی کتاب

جلد شائع ہونے والی ہے۔

مزید معلومات

Mobile: 0300-2215023

Email: rashidabid@yahoo.com